



МОМІКСОН

мометазону фуurato

- Відновлює близьку до правильної гістологічну структуру слизової оболонки носа¹
- Чинить протизапальну дію на будь-якій стадії алергічної реакції¹
- Пригнічує виділення медіаторів алергічних реакцій¹

Лікування сезонного або цілорічного алергічного риніту¹:

Від 3 років




1

впорскування
у кожен ніздрю

1 раз на добу

добова доза
100 мкг

Від 12 років



2


впорскування
у кожен ніздрю

1 раз на добу

добова доза
200 мкг

Лікування
назальних поліпів¹:

Від 18 років



2

впорскування
у кожен ніздрю

1 раз на добу

добова доза
200 мкг



Коротка інструкція для медичного застосування препарату Моміксон

Склад: діюча речовина: мометазону фуurato моногідрат; 1 доза спрею містить мометазону фуurato моногідрат 0,05173 г, що еквівалентно мометазону фуurato 50 мкг; допоміжні речовини: бензалконію хлорид розчин, гліцерин, полісорбат 80, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармеллоза, кислота лимонна, моногідрат, натрію цитрат, вода очищена. **Показання:** лікування сезонного або цілорічного алергічного риніту у дорослих та дітей віком від 3 років. Лікування назальних поліпів у пацієнтів віком від 18 років. **Протипоказання:** підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату. Препарат не слід застосовувати при наявності нелікованої локалізованої інфекції із залученням слизової оболонки носової порожнини (наприклад, простий герпес). Оскільки кортикостероїди мають ефект пригнічення загоєння рани, пацієнтам, яким нещодавно робили операцію у носовій порожнині або у яких були травми, не можна застосовувати назальний кортикостероїд, поки не відбудеться загоєння. **Побічні реакції:** носові кровотечі, що виникали, були помірними і припинялися самовільно, спостерігалися частіше

порівняно з плацебо (5%), однак частота виникнення була подібною або меншою порівняно з назальними кортикостероїдами, що застосовувалися у контрольній групі (до 15%) у клінічних дослідженнях у пацієнтів з алергічним ринітом. Частота виникнення інших побічних ефектів була зівставна з такою при використанні плацебо. У пацієнтів, які проходять лікування у зв'язку з поліпами носа, загальна частота виникнення побічних ефектів була зівставна з частотою, виявленою у пацієнтів з алергічним ринітом (див. повну інструкцію).

Категорія відпуску: за рецептом. Р.П. UA/16749/01/01, №1664 від 12.09.2018.

Для отримання повної інформації обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування препарату Моміксон в Україні.

1. Інструкція для медичного застосування препарату. P-MOM-01-082019

Матеріал призначено для професійної діяльності фахівців сфери охорони здоров'я. Підлягає розповсюдженню на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики.



Представництво «Адамед Фарма С.А.» в Україні:
01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 23, оф. 2. Тел.: +38 044 374 67 55