

# ЕРМУЦИН®

ердостейн

Оригінальний ердостейн, Edmond Pharma, Італія (Recipharm Group)

## МУКОЛІТИК НОВОГО ПОКОЛІННЯ З ПЛЮС ЕФЕКТОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАШЛЮ ТА ЗАПАЛЕННЯ<sup>1,2,3</sup>



ВИРАЖЕНА ПРОТИЗАПАЛЬНА  
ДІЯ<sup>1,2,3</sup>



КАШЕЛЬ СТАЄ НЕЧАСТИЙ,  
М'ЯКИЙ, ШВИДКО МИНАЄ<sup>1</sup>



ПОПЕРЕДЖЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ  
ТА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ  
ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ<sup>1,4</sup>



ЗМЕНШУЄ ЧАСТОТУ ЗАГОСТРЕНЬ  
ХОЗЛ<sup>1,5</sup>



Вересень 2020

dileo-farma.com.ua

**Dileo**  
FARMA

04119, м. Київ,  
вул. Юрія Іллєнко, 83-Д, оф. 404  
тел.: (044) 538-01-26,  
факс: (044) 538-01-27

### Коротка характеристика лікарського засобу Ермуцин.

Р/с № UA/14088/01/01. Наказ МОЗ № 2319, від 21.11.2019.

Склад: дюча речовина: erdosteine. 1 капсула містить ердостейн 300 мг. **Показання:** Для зменшення в'язкості та полегшення відхаркування бронхіального секрету при лікуванні гострих і хронічних захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів, таких як бронхіальні риніт, синусит, ларингофарінгіт, загострення хронічного бронхіту, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), гіперреактивність до дючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, перепічених або до речовин, що містять вільні SH-групи. Слід припинити застосування цього препарату в таких випадках: при розладах з боку печінки (наприклад при збільшенні рівнів лужної фосфатази або трансаміназ у сироватці крові тощо); при нирковій недостатності (кліренс креатиніну < 25 мл/хв); при гомоцитинні; при виразковій хворобі в активній фазі. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.** Не постепінсяло жодних небажаних взаємодій з іншими лікарськими засобами, які часто застосовуються при інфекціях дихальних шляхів та ХОЗЛ, такими як теофілін, бронхолітичні сполуки, ерітроміцин, амоксицилін або сульфаметоприм. Ердостейн потенціює дію деяких антибіотиків (наприклад амоксициліну, кларітроміцину), які можуть застосовуватися разом із бронходилататорами (теофіліном або бета-2-адреноміметиками, лікарськими засобами від кашлю та ін.). Був доведений синергічний ефект ердостеину при одночасному застосуванні з будесонідом та сальбутамолом. **Способ застосування і дози:** Препарат Ермуцин призначений для застосування дорослим по 1 капсули (300 мг) 2 рази на день. Лікування може тривати до 10 днів. **Побічні реакції:** З боку нервової системи: дуже рідко – головний біль. З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння: дуже рідко – задишка. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – смакові розлади (агевзія або дисгевзія), нудота, блівлення, діарея, відчуття печіння та болі в шлунку. З боку шкіри та підшкірної клітковини: дуже рідко – крапивниця, почечревоніння, екзема. З боку імунної системи: рідко – набряк Квінке. **Загальні розлади:** рідко – неочікувана гемопрепарезія.

Для отримання детальної інформації ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Інформація для фахівців охорони здоров'я для використання в професійній діяльності.

1. Островський М.М. Запалення, як причина кашлю. Нові можливості сучасників муколітиків. Медична газета «Здоров'я України» 21 сторіччя» № 9 (478), травень 2020 р.

2. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Ермуцин. Затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України № 2319, від 21.11.2019. р/с № UA/14088/01/01.

3. Sogo R. Erdosteine: a new therapeutic weapon beyond the PEACE. Trends Med 2012; 12(3):133-142.

4. Rogliani Paola at all. Efficacy and safety profile of mucolytic/antioxidant agents in chronic obstructive pulmonary disease: a comparative analysis across erdosteine, carbocysteine, and N-acetylcysteine. Respir Res. 2019 May 27;20(1):104.

5. Dal Negro RW. Effect of erdosteine on the rate and duration of COPD exacerbations: the RESTORE study. European Respiratory Journal, Oct 2017.



Є ПЛЮС!