Boehringer Ingelheim

ТІОТРОПІЙ ВЖЕ ОБРАЛИ ПОНАД 50 МІЛЬЙОНІВ ПАЦІЄНТІВ У ВСЬОМУ СВІТІ[1]

Boehringer Ingelheim

ТІОТРОПІЙ ЗНИЖУЄ РИЗИК СМЕРТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХОЗЛ на 16%[2,*]

Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу Спіріва® Респімат®

Склад: дієча речовина: тіотропію броміду моногідрат, що відповідає: тіотропію: 1 інгаляція містить тіотропію броміду моногідрату 3,124 мкг, що відповідає 2,5 мкг тіотропію; допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат, всова вода, кислота хлористоводнева розведена. Лікарська форма. Розчин для інгаляцій. Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Антихолінергічні засоби. Тіотропію бромід. Код АТХ R03B B04. Показання. ХОЗЛ: Підтримуюча бронхолітична терапія для полегшення симптомів у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Астма: СПІРІВА РЕСПІМАТ призначений як бронходилятатор для додаткової підтримуючої терапії дорослих та дітей від 6 років з тяжкою астмою, які перенесли як мінімум один випадок загострень астми протягом попереднього року (див. розділ «Спосіб застосування та дози», «Фармакодинаміка»). Протипоказання. Гіперчутливість до тіотропію бромиду, атропіну або його похідних, наприклад до іпратропію або оксітропію, або до інших компонентів препарату. Спосіб застосування та дози.* Лікарський засіб призначений тільки для інгаляційного застосування. Картридж можна використовувати тільки з інгаляційним пристроєм РЕСПІМАТ. Два вдихи за допомогою інгалятора РЕСПІМАТ містять одну дозу. Рекомендована доза для дорослих становить 5 мкг тіотропію у вигляді двох інгаляцій за допомогою інгалятора РЕСПІМАТ один раз на добу в один і той же час доби. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. При лікуванні астми користь від препарату повинна мірою проявитися після кінця дня лікарського засобу. Діти: Астма: Рекомендована доза для пацієнтів віком від 6 до 17 років становить 5 мкг тіотропію у вигляді двох інгаляцій за допомогою інгалятора РЕСПІМАТ один раз на добу в один і той же час доби. Безпеку та ефективність препарату СПІРІВА РЕСПІМАТ для дітей віком до 6 років не встановлено (див. розділ «Фармакологічні властивості та «Спосіб застосування та дозе»). ХОЗЛ: Досвіду застосування препарату СПІРІВА РЕСПІМАТ дітям (віком до 18 років) немає. Побічні реакції.* Багато із зазначених небажаних ефектів можна віднести до антихолінергічних властивостей тіотропію бромиду. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ. Реєстраційне посвідчення. UA/6495/02/01. Терміи дії реєстраційного посвідчення: з 24.07.2015 по 24.07.2020. *Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу Спіріва® Респімат®.

Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу Спіріва®

Склад: дієча речовина: тіотропію бромід; 1 капсула містить тіотропію бромиду моногідрату 22,5 мкг, що відповідає тіотропію 18 мкг; допоміжні речовини: лактоза моногідрат мікронізований, лактоза моногідрат 200 М. Лікарська форма. Порошок для інгаляцій, тверді капсули. Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів, інгаляційні засоби. Антихолінергічні засоби. Код АТХ R03B B06. Показання. Підтримуюча бронхолітична терапія для полегшення симптомів при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ). Протипоказання. Порошок для інгаляцій СПІРІВА протипоказаний пацієнтам з відомою гіперчутливістю до тіотропію бромиду, атропіну або його похідних (до іпратропію або оксітропію) або до інших компонентів препарату. Спосіб застосування та дозе*. Лікарський засіб призначений лише для застосування всередині. Рекомендована доза СПІРІВА: одна інгаляція вмісту однієї капсули 1 раз на добу за допомогою інгаляційного пристрою ХЕНДІХЕЛЕР. Інгаляцію слід робити в один і той же час доби. Рекомендовану дозу не слід перевищувати. Капсули не призначені для перорального застосування, капсули СПІРІВА не можна ковтати. Препарат слід застосовувати лише за допомогою інгаляційного пристрою ХЕНДІХЕЛЕР. Побічні реакції.* Багато з перерахованих небажаних ефектів можна віднести до антихолінергічних властивостей СПІРІВИ. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина. Реєстраційне посвідчення. UA/6495/01/01. Терміи дії реєстраційного посвідчення: необмежений з 15.02.2017. *Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу Спіріва®.

Інформація про лікарський засіб, призначена для розповсюдження серед професіоналів сфери охорони здоров'я під час проведення семінарів, конференцій, симпозіумів на медичну тематику або у якості індивідуально спрямованої інформації задля потреб конкретних професіоналів сфери охорони здоров'я.

Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: MEDIAB@MedicalInformation.AB@boehringer-ingelheim.com.

При підозрі на побічні реакції, з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають відношення до вищенаведеного вище, слід звертатися за телефонами: +380 44 494 12 75, факсом +380 44 494 12 71, або електронною поштою: PV_local_Ukraine@boehringer-ingelheim.com

Представництво «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко Кг» в Україні: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28А, 3 поверх; тел.: (044) 494-12-75.

Boehringer Ingelheim

ТІОТРОПІЙ ДОСТУПНИЙ У ТРЬОХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ:[7-9]

СПІОЛТО® РЕСПІМАТ® (тіотропію бромід + олодатерол)

СПІРІВА® (тіотропію бромід)

СПІРІВА® РЕСПІМАТ® (тіотропію бромід)

Boehringer Ingelheim

РЕСПІМАТ®

УНІКАЛЬНА АЕРОЗОЛЬНА ХМАРКА, ЩО ПРОНИКАЄ ГЛИБОКО В ЛЕГЕНІ[4-6]

ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ВАШИМ ПАЦІЄНТАМ — ЦЕ ДИХАТИ ПРИРОДНЬО

Boehringer Ingelheim

ТІОТРОПІЙ ЗНИЖУЄ РИЗИК ЗАГОСТРЕНЬ ХОЗЛ ДО 35%[3]

Boehringer Ingelheim

БРОНХОДИЛЯТАЦІЯ ВІДІГРАЄ КЛЮЧОВУ РОЛЬ У ЛІКУВАННІ ТЕРАПІЇ ХОЗЛ[10]

Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу Сіолто® Респімат®

Склад: діючі речовини: тіотропій, олодатерол; 1 інгаляція містить 2,5 мкг тіотропію (у вигляді броміду моногідрату), 2,5 мкг олодатеролу (у вигляді гідрохлориду); допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат дигидрат, вода очищена, кислота хлористоводнева 1М. Лікарська форма. Розчин для інгаляції. Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин для інгаляцій. Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними. Код АТХ R03A L06. Показання. Підтримуюча бронхолітична терапія для полегшення симптомів у дорослих пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Протипоказання. Підвищена чутливість до діючих речовин або до інших компонентів препарату. Підвищена чутливість до атропіну або його похідних, наприклад до іпратропію або оксітропію, в анамнезі. Спосіб застосування та дози.* Лікарський засіб призначений тільки для інгаляційного застосування. Картридж можна використовувати тільки з інгаляційним пристроєм РЕСПІМАТ. Два вдихи за допомогою інгалятора РЕСПІМАТ містять одну дозу. Рекомендована доза становить 5 мкг тіотропію та 5 мкг олодатеролу у вигляді двох вдихів за допомогою інгалятора РЕСПІМАТ один раз на добу в один і той же час доби. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Побічні реакції.* Багато із зазначених небажаних ефектів можна віднести до антихолінергічних властивостей тіотропію бромиду або до β2-адренергічних властивостей олодатеролу. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ. Реєстраційне посвідчення. UA/15523/01/01. Терміи дії реєстраційного посвідчення: з 10.11.2016 по 10.11.2021. *Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу Сіолто® Респімат®.

1. Орієнтовна кількість пацієнтів, що використовують лікарські засоби Спіріва та Спіріва Респімат, беручи до уваги сукупні дані з усіх країн, де ці лікарські засоби зареєстровані (розраховано на початок року). Дані доступні за посиланням https://pyramidcalc.pl/uploads/pdf/Sfinia_part%20_years_Spiriva_exposure.pdf (Дата останнього доступу: 08.11.2016)
2. Tashkin DP et al. A 4-Year Trial of Tiotropium in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 2008; 359:1543–1554 DOI: 10.1056/NEJMoa0805800
3. Dusser D. et al. The effect of tiotropium on exacerbations and airflow in patients with COPD; Eur Respire J 2006; 27:547-555
4. Newman SP. et al. Lung deposition of fenoterol and flunisolide delivered using a novel device for inhaled medicines: comparison of RESPIMAT with conventional metered dose inhalers with and without spacer devices; Chest 1998; 113:957-963
5. Pitsiou G. et al. Deposition of corticosteroid aerosol in the human lung by Respimat Soft Mist inhaler compared to deposition by metered dose inhaler or by Turbuhaler dry powder inhaler; J Aerosol Med. 2005; 18(3):264-72
6. Peterson JB. et al. Aerosol Deposition in the Human Lung Periphery Is Increased by Reduced-Density Gas Breathing.; J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2008;Jun; 21(2): 159–168
7. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Спіріва®
8. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Спіріва® Респімат®
9. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Сіолто® Респімат®
10. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Available at: HYPERLINK «http://www.goldcopd.org» www.goldcopd.org.
11. Bárbara C. et al. The importance of dyspnoea in the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease – a descriptive analysis of a stable cohort in Portugal (SAFE trial). Rev Port Pneumol. 2011 May-Jun;17(3):131-8.

В Протягом лікування на 16 % знижувався ризик летальності.[1]

Boehringer Ingelheim

ЗАДИШКА — ОДИН ІЗ НАЙЧАСТІШИХ СИМПТОМІВ НА ВСІХ СТАДІЯХ ХОЗЛ[11]

77% ПАЦІЄНТІВ ВЖЕ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ХОЗЛ СТРАЖДАЮТЬ ВІД ЗАДИШКИ[11]

Boehringer Ingelheim

МІСТИТЬ БРОНХОЛІТИК ТРИВАЛОЇ ДІЇ — ТІОТРОПІЙ®

Boehringer Ingelheim

МІСТИТЬ БРОНХОЛІТИК ТРИВАЛОЇ ДІЇ — ТІОТРОПІЙ®

Boehringer Ingelheim

МІСТИТЬ БРОНХОЛІТИК ТРИВАЛОЇ ДІЇ — ТІОТРОПІЙ®

PC-UA-100294 Respiratory-Respiratory-01-2020