

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПІСЛЯІНФЕКЦІЙНОЇ КАШЛЬОВОЇ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ

І. В. Баранова¹, І. А. Ільюк¹, С. І. Лещенко², О. В. Солейко¹, К. П. Постовітенко¹,

І. В. Куриленко³, Н. М. Приходько¹

¹Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

²ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна

³Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-лікувальний комплекс)

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

Резюме. *Актуальність проблеми.* Пошук нових методів лікування синдрому післяінфекційної кашльової гіперчутливості є актуальною проблемою практичної медицини. *Мета:* оптимізувати лікування хворих з синдромом післяінфекційної кашльової гіперчутливості. *Матеріали та методи.* Обстежено 66 хворих із синдромом післяінфекційної кашльової гіперчутливості. Всім пацієнтам призначались протикашльові засоби. Хворі основної групи ($n = 33$) отримували додатково небулайзерну терапію з 0,1 % розчином гіалуринової кислоти двічі на день, курс лікування 12–16 сеансів. Кінцевими точками дослідження були: покращення показників якості життя, досягнення пацієнтами стану суб'єктивного здоров'я, розвитком реакцій спокійної та підвищеної активації, зменшення строків тимчасової непрацездатності хворих із синдромом післяінфекційної кашльової гіперчутливості. *Результати.* У всіх пацієнтів основної групи ($p < 0,001$) досягнута повна ремісія синдрому післяінфекційної кашльової гіперчутливості, із зникненням клінічних проявів, розвитком реакцій спокійної та підвищеної активації адаптаційних систем організму. В 52 % осіб групи порівняння ($p < 0,01$) відзначалось зменшення клінічних ознак захворювання на тлі стресу, переактивації чи неповноцінної адаптації, що відповідало неповній ремісії. *Висновки.* Раціональна комбінація медикаментозних препаратів та небулайзерний спосіб введення гіалуринової кислоти дозволяє в короткі строки усунути симптоми захворювання, відновити якість життя пацієнтів, досягти повної ремісії синдрому післяінфекційної кашльової гіперчутливості.

Ключові слова: синдромом післяінфекційної кашльової гіперчутливості, адаптаційні реакції організму, небулазерна терапія, гіалуронова кислота.

*І. В. Баранова,
к. мед. н., доцент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Вінницький національний
медичний університет ім. М. І. Пирогова
21000, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56,
e-mail: ibaranova566@gmail.com
Астма та Алергія, 2020, № 4, С. 39–47.*