

Авелокс®

Комфортний політ: Преміум клас!

Аеро....

Авелокс®

Моксифлоксацин

Антибактеріальний
препарат останньої
генерації
фторхінолонового
ряду



Авелокс. Таблетки, вкриті оболонкою. Одна таблетка містить 400 мг моксифлоксацину. Розчин для інфузій. 1 флакон (250 мл розчину) містить 400 мг моксифлоксацину. **Показання для застосування.** Лікування у дорослих наступних інфекцій: Гострий синусит. Позалікарняна пневмонія, включаючи пневмонію, збудниками якої є штами мікроорганізмів з множинною резистентністю до антибіотиків. Загострена хронічного бронхіту. Неускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин. Ускладнені інфекції шкіри та підкірних структур, (включаючи інфіковану діабетичну стопу). Ускладнені інтраабдомінальні інфекції, включаючи полімікробні інфекції (такі як абсцедування). **Дози.** Дорослим рекомендується приймати по 400 мг моксифлоксацину на день при будь-яких інфекціях. Моксифлоксацин приймається внутрішньо або внутрішньовенно протягом всього лікування. Також можливе внутрішньовенне введення препарату з наступним прийомом внутрішньо в залежності від стану пацієнта. **Противопоказання.** Гіперчувствливість до моксифлоксацину або будь-якого компоненту препарату, від 18 років, вагітність і період лактації. **Побічна дія:** • 1% <10%: болі в животі, подовження інтервалу QT у хворих з супутньою гіпокаліємією, нудота, діарея, блівота, симптоми дисплесії, тимчасове підвищення рівня трансаміназ, запаморчення, головний біль, кандидозна суперінфекція, включаючи стоматит, вагініт. • 0.1% <1%: астенія, слабкість/гіпергідроз, дегідратація, кропів'янка, суд, висип, прискорене серцебиття, подовження QT, неспецифічні аритмії, метаболізм, запор, відсутність апетиту, дисплесія, гастроenterит, підвищенні ГТП, амілази, білірубіна, порушення функції печінки, підвищення в сироватці лужної фосфатази, анемія, лейкоцитопения, тромбоцитоз, еозинофілія, тромбоцитопенія, артрапгія, міалгія, розлад свідомості, безсоння, запаморчення, сонливість, відуття тривоги, трером, парестезії/дизестезії, нервозність, розлад смаку, розлад зору, диплопія, задишка, гіперлідемія. • 0.01% <0.1%: болі в області таза, набряк обличчя, біль в спині, зміна лабораторних тестів, алергійні реакції, біль в ногах, анафілактичні/анафлактогідні реакції, ангіоневротичні набряки, шлуночкові тахіаритмії, гіпотензія. вадозиллятация, дисфагія, псевдомемброзний коліт, жовтяниця, гепатит, зміна рівня тромбобластину, подовження протромбінового часу, гіперглікемія, гіперурикемія, тендініт, судоми м'язів, патологічні синовідіння, порушення координати, судомні припадки, порушення уваги, розлад мови, амнезія, емоційна лабільність, галюцинації, депресія, гіпестезія, шум у вухах, порушення нюху, включаючи аносмію, порушення функції нирок. • <0.01%: анафілактичний шок (в тому числі такий, що загрожує життя), розрив сухожиль, артрити, поліморфна шлуночкова тахікардія, зміна лабораторних показників, не пов'язана безпосередньо з прийомом моксифлоксацину: збільшення рівня протромбіну/зменшення МНВ, зміна рівня протромбіну МНВ, збільшення або зменшення величини гематокриту і вмісту еритроцитів, лейкоцитоз, гіпоглікемія, зниження гемоглобіну, підвищення лужної фосфатази, АСТ, АЛТ, білірубіну, сечової кислоти, креатиніну, сечовини. Пацієнти повинні визначити свою реакцію на препарат, перед тим, як керувати автомобілем механізмами, що рухаються. **Додаткова інформація про препарат міститься в інструкції до медичного застосування.**

Р.П. № UA/3871/01/01 від 09/11/05, UA/3871/02/01 від 09/11/05

* J.A. Barman Balfour, H.M. Lamb: Drugs 2000 Jan; 59 (1): 1151/93