

Одобрено МЗ Украины
только для оригинального
Симбикорта® Турбухалера®

Симбикорт® Турбухалер®

для базисной терапии и купирования симптомов




АСТМА



Эффективный¹, быстрый², простой³ контроль бронхиальной астмы

Симбикорт®
будесонид/формотерол

Краткая информация о применении препарата СИМБИКОРТ® ТУРБУХАЛЕР® (порошок для ингаляций)



Состав

1 доза содержит 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола.

Фармакологические свойства

Будесонид — глюкокортикостероид. Формотерол — селективный агонист β_2 -адренергических рецепторов быстрого и длительного действия.

Показания к применению

Регулярное лечение пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) умеренной и тяжелой степени, с часто повторяющимися симптомами и обострениями в анамнезе. Лечение бронхиальной астмы в

случаях, когда необходимо применение комбинации ингаляционного кортикостероида и β_2 -агониста длительного действия.

Способ применения и дозы

ХОЗЛ

Взрослые: 2 ингаляции 2 раза в сутки.

Поддерживающая терапия и купирование симптомов бронхиальной астмы

Взрослые: поддерживающая доза 1 ингаляция 2 раза в день утром и вечером, или 2 ингаляции утром или вечером. Некоторым пациентам может быть рекомендована поддерживающая доза 2 ингаляции 2 раза в день. При возникновении симптомов, используется

дополнительная ингаляция Симбикорта для их купирования. Суммарная суточная доза не должна превышать 8 ингаляций, однако временно может быть использовано до 12 ингаляций в сутки.

Дети и подростки (до 18 лет): применение в режиме поддерживающей терапии бронхиальной астмы.

Побочное действие

См. инструкцию по медицинскому применению. Наиболее распространенные побочные явления: головная боль, тремор, кандидозы слизистой оболочки полости рта и глотки, тахикардия, тошнота, головокружение, мышечные судороги.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к будесониду, формотеролу или лактозе.

Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению.

Условия отпуска.

По рецепту. РС МЗ Украины № UA/5433/01/02. Текст составлен согласно Инструкции для медицинского применения, одобренной МЗ Украины 16.11.2006 г. Симбикорт Турбухалер — торговые марки, собственность компании АстраЗенека. © AstraZeneca 2006-2011

Литература: 1. Global Initiative for Asthma 2010, www.ginasthma.org. 2. Balanag VM, et al. Pulm Pharm Ther 2006;19:139 - 147. 3. Gibson PG, et al. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:95-96

За полной информацией обращаться в ООО «АстраЗенека Украина»:
04050 г. Киев, ул. Н. Пимоненко, 13, корпус 1, 2-й этаж. Тел.: 391 52 82
www.astrazeneca.ua

AstraZeneca