

# Симбикорт® Турбухалер®

## Легко дышать – легко жить!



# ХОЗ



**Симбикорт®**  
будесонид/формотерол

### Краткая информация о применении препарата СИМБИКОРТ® ТУРБУХАЛЕР® (порошок для ингаляций дозированных)

**Состав.** 1 доза содержит 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола.

**Фармакологические свойства**

В состав Симбикорта входят будесонид и формотерол, которые имеют разные механизмы действия и оказывают аддитивный эффект, снижая частоту обострений. Будесонид — глюкокортикостероид с дозозависимым противовоспалительным действием. Формотерол — селективный агонист  $\beta_2$ -адренергических рецепторов быстрого и длительного действия.

**Показания к применению**

- Лечение пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) тяжелой степени (ОФВ<sub>1</sub> < 50%), с часто повторяющимися обострениями в анамнезе.
- Лечение бронхиальной астмы в случаях,

когда необходимо применение комбинации ингаляционного кортикостероида и  $\beta_2$ -агониста длительного действия.

**Способ применения и дозы**

**ХОЗЛ**  
*Взрослые:* 2 ингаляции 2 раза в сутки.

**Бронхиальная астма:**  
*Поддерживающая терапия и купирование симптомов бронхиальной астмы*

*Взрослые (от 18 лет):* поддерживающая доза составляет 1 ингаляция 2 раза в день утром и вечером, или 2 ингаляции утром или вечером. Некоторым пациентам может быть рекомендована поддерживающая доза 2 ингаляции 2 раза в день. При возникновении симптомов следует использовать дополнительную ингаляцию Симбикорта для их купирования.

Если симптомы не прекращаются, следует использовать еще 1 ингаляцию. Не следует проводить более 6 ингаляций за один раз. Общая суточная доза не должна превышать 8 ингаляций, однако временно может быть использовано до 12 ингаляций в сутки.

**Поддерживающая терапия:**

*Подростки (12-17 лет) и взрослые:* 1-2 ингаляции два раза в день

**Побочное действие**

См. инструкцию по медицинскому применению. Наиболее распространенные побочные явления: головная боль, тремор, кандидозы слизистой оболочки полости рта и глотки, умеренное раздражение в горле, кашель, охриплость, ускоренное сердцебиение, тошнота, головокружение, мышечные судороги.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к будесониду, формотеролу или лактозе.

**Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению.**

**Условия отпуска.** По рецепту.

Регистрационное свидетельство: UA/5433/01/02 с 16.09.2011 по 16.09.2016 сроком на 5 лет.

Текст составлен согласно Инструкции по медицинскому применению, одобренной МЗ Украины 16.09.2011 г.

Симбикорт® Турбухалер® — торговые марки, собственность компании АстраЗенека. © AstraZeneca 2007-2011

\* ИКС+БАДД рекомендованы как препараты первого выбора для пациентов категорий С и D. ИКС — ингаляционный кортикостероид, БАДД —  $\beta_2$ -агонист длительного действия.  
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2011, www.goldcopd.org

**За полной информацией обращаться в ООО «АстраЗенека Украина»:  
04050 г. Киев, ул. Н. Пимоненко, 13, корпус 1, 2-й этаж. Тел.: 391 52 82.  
www.astrazeneca.ua**

**AstraZeneca**