

Эреспал®

фенспирид

Комплексное действие на воспаление¹

Лечение острых и хронических воспалительных процессов

- ЛОР органов
- Дыхательных путей
- ХОЗЛ

ДЕТИ:

Сироп

4 мг/кг (2 мл/кг) массы тела
в сутки

От 2 до 12 лет:

макс. суточная доза
120 мг (60 мл)

От 12 до 18 лет:

макс. суточная доза
180 мг (90 мл)

ВЗРОСЛЫЕ:

2-3 таблетки
в сутки



Инструкция по медицинскому применению препарата Эреспал® (Eurespal®)
Состав: действующее вещество: 1 таблетка содержит 80 мг фенспирида гидрохлорида; 100 мл сиропа содержат 200 мг фенспирида гидрохлорида.
Фармакотерапевтическая группа: средства, действующие на респираторную систему. Другие средства для системного применения при обструктивных заболеваниях дыхательной системы. Код АТС R03D X03. Фармакодинамика: Эреспал® имеет антибронхоконстрикторные и противовоспалительные свойства. Фармакокинетика: максимальная концентрация в плазме крови достигается в среднем через 6 часов, период полувыведения – 12 часов, выводится из организма преимущественно с мочой. **Показания:** лечение острых и хронических воспалительных процессов ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит), хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ), в составе комплексной терапии бронхиальной астмы; сезонный и круглогодичный аллергический ринит и другие проявления аллергии со стороны респираторной системы в ЛОР-органах; респираторные проявления кори, гриппа; симптоматическое лечение коклюша. **Противопоказания:** для таблеток – повышенная чувствительность (аллергия) к активному веществу или к любому из компонентов препарата; для сиропа дополнительно – повышенная чувствительность к компонентам препарата в анамнезе, особенно к красителю оранжево-желтому S (E 110), метил- и пропиленгликолю, пропиленгликолю (E 218, E 216), детский возраст до 2 лет. **Побочные реакции:** во время лечения могут наблюдаться побочные эффекты, перечисленные ниже с использованием следующей классификации: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). **Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы:** частота неизвестна – умеренная синусовая тахикардия, которая уменьшается при снижении дозы. **Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:** часто – расстройство пищеварения, тошнота, боль в желудке; частота неизвестна – диарея, рвота. **Нарушения со стороны нервной системы:** редко – сонливость; частота неизвестна – головокружение. **Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани:** редко – эритема, фиксированная пигментная эритема, сыпь, крапивница, отек Квинке; частота неизвестна – зуд. **Общие расстройства:** частота неизвестна – астения (слабость), утомляемость. **Дети:** таблетки не применяют в педиатрической практике. Детям старше 2 лет препарат применяют только в виде сиропа. **Передозировка:** при приеме большого количества препарата могут наблюдаться сонливость или возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия. **Применение в период беременности и кормления грудью:** не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью. Полную информацию можно найти в инструкции по медицинскому применению препарата. **Регистрационные свидетельства:** таблетки № UA/3703/02/01 от 01.09.2010 № 751; сироп № UA/3703/01/01 от 01.09.2010 № 751.

1. Инструкция по медицинскому применению препарата.

Информация о лекарственном препарате для профессиональной деятельности специалистов здравоохранения.



Представительство Ле Лаборауар Сервье в Украине:
01054, г. Киев, ул. Воровского, 24, Тел.: (044) 490-34-41,
факс: (044) 490-34-40

Для дополнительной информации посетите сайт:
www.servier.ua