

Увага! Важлива інформація про лікарський засіб

# Аугментин™

Оригінальний амоксициллін/клавуланат

- **Аугментин™** ефективний щодо широкого спектру збудників інфекцій дихальних шляхів, в т.ч. до основних респіраторних патогенів<sup>1</sup>:

S.pneumoniae



H.influenzae



M.catarrhalis



S.aureus



Анаероби



- При бактеріальних інфекціях дихальних шляхів **Аугментин™** має високу клінічну ефективність:

Негоспітальна пневмонія <sup>2</sup>	Інфекційні загострення ХОЗЛ <sup>3</sup>	Рецидивуючий тонзиліт <sup>4</sup>	Гострий бактеріальний середній отит <sup>5</sup>	Гострий бактеріальний риносинусит <sup>6</sup>
<b>93,1%</b>	<b>98,6%</b>	<b>95,7%</b>	<b>90,5%</b>	<b>90–92%</b>

- **Аугментин™** рекомендований як препарат вибору при бактеріальних інфекціях дихальних шляхів<sup>7,8</sup>

## Схеми застосування та дози:

### ДОРОСЛИМ

таблетки 625 мг або 1000 мг  
(залежить від тяжкості стану)  
по 1 таблетці 2 рази на добу  
на початку прийому їжі



### ДІТЯМ

сuspензія 228,5 мг/5 мл  
45 мг/кг/добу у 2 прийоми  
на початку прийому їжі



#### Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Аугментин™:

Форми випуску: порошок для приготування суспензії 228,5 мг/5 мл; порошок для приготування суспензії 642,9 мг/5 мл; таблетки 625 мг, таблетки 1000 мг, порошок для приготування розчину для ін'єкції 500/100 мг, 1000/200 мг. Активні речовини: амоксицилін тригідрат, калій клавуланат.

Показання: лікування бактеріальних інфекцій, які викликані чутливими до Аугментину мікроорганізмами. Спосіб застосування та дози: дорослі та діти старше 12 років таблетки 625 мг 2 рази на добу при інфекціях легкого та помірного ступеня тяжкості, таблетки 1000 мг 2 рази на добу при інфекціях з тяжким перебігом. Застосування в дитячому віці: у формі суспензії діти від 2 місяців до 12 років 25/3,6 мг/кг/добу в 2 прийоми при інфекціях легкої та помірної ступені тяжкості, 45 мг/кг/добу в 2 прийоми при інфекціях тяжкого ступеня, 90 мг/кг/добу в 2 прийомах у дітей з груп ризику. Протипоказання: підвищена чутливість до бета-лактамів, наявність в анамнезі жовтяниці або дисфункції печінки, пов'язаних із застосуванням Аугментину.

Вагітність: категорія В.Період годування груддю: Аугментин™ можна за-

стосовувати в період годування груддю. Можливі побічні реакції: діарея, нудота, блівяння, кандидоз шкіри та слизових оболонок шкірні висипання, свербіж, крапив'янка, поліморфа еритема, оборотна лейкопея та тромбоцитопенія, оборотний агранулоцитоз та гемолітична анемія, збільшення часу кровотечі та протромбінового індексу, ангіоневротичний набряк, анафілаксія, сиропатокіндрійний синдром, алєргічний вакспуз, запаморочення, головний біль, оборотна гіперактивність і конвульсії, антибиотикасойзований коліт, чорний «волосятий» язик, помірна підвищення рівня АСТ та/або АЛТ, гепатит та холестатична жовтяниця, синдром Стівена-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, пухирчастий ексfolіативний дерматит, гострий генералізований екзантематозний пустулюз, інтерстиціальні нефрит, кристалурія. Взаємодія з іншими лікарськими засобами: можлива взаємодія з пробенецидом, алопурінолом, естрогенами. Передозування: лікування симптоматичне. Особливості застосування: не слід призначати при підозрі на інфекційний мононуклеоз. При супутньому прийомі антико-

агулянтів необхідний відповідний моніторинг. Слід з обережністю призначати пацієнтам з дисфункцією печінки. Необхідна корекція дози у пацієнтів з порушенням функції нирок. Застосовувати з обережністю у пацієнтів з фенілкетонуриєю. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Перед призначенням слід ознайомитись з повною інструкцією для медичного застосування.

Р.Л. №UA/0987/05/01 від 15.02.10, №UA/0987/04/01 від 18.11.09,

№UA/0987/01/01 від 15.02.10, №UA/0987/01/02 від 15.02.10,

№UA/0987/02/02 від 07.07.08, №UA/0987/02/01 від 03.11.09.

Повідомити про небажане явище або скргу на якість препарату

та отримати додаткову інформацію про препарат Ви можете в

ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»:

03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17. Тел.: (044) 585-51-85 - 86.

[www.gsk.com.ua](http://www.gsk.com.ua)

Література: 1. Інструкція з медичного застосування препарату Аугментин™. 2. Paris R, et al. Efficacy and safety of azithromycin 1 g once daily for 3 days in the treatment of community-acquired pneumonia: an open-label randomised comparison with amoxicillin-clavulanate 875/125 mg twice daily for 7 days. J Chemother. 2008 Feb;20(1):77-86. 3. Beghi G, et al. Efficacy and treatability of azithromycin versus amoxicillin/clavulanic acid in acute purulent exacerbation of chronic bronchitis. Jurnal of chemotherapy 1995;7:146-152. 4. Mahakit P, et al. Oral clindamycin 300 mg BID compared with oral amoxicillin/clavulanic acid 1 g BID in the outpatient treatment of acute recurrent pharyngotonsillitis caused by group A β-hemolytic streptococci: An international, multicenter, randomized, investigator-blinded, prospective trial in patients between the ages of 12 and 60 years. Clinical therapeutics. 2006 Jan; 28(1):99-109. 5. Hoberman A, et al. Large dosage amoxicillin/clavulanate, compared with azithromycin, for the treatment of bacterial acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J. 2005 Jun;24(6):525-32. 6. Sinus and allergy health partnership (SAHP). Antimicrobial treatment guidelines for acute bacterial rhinosinusitis. Otolaryngology-Head and neck surgery (2004), 130(1): 1-45. 7. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007. 8. Наказ МОЗ України №181 від 24.03.2009.

Інформація для лікарів для використання у професійній діяльності.