

ТЕПЕРЬ ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХОЗЛ



	80/4,5	160/4,5	320/9
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: базисная терапия*	✓	✓	✓
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: базисная терапия + купирование симптомов**	✓	✓	
ХОЗЛ		✓	✓

* У детей 6 лет и старше – только доза 80/4,5 мкг, у подростков с 12 лет и взрослых – дозы 160/4,5 мкг и 320/9 мкг.
** Только у взрослых старше 18 лет.

Информация предназначена исключительно для медицинских работников

Краткая информация о применении препарата

СИМБИКОРТ® ТУРБУХАЛЕР®
(порошок для ингаляций дозированных)

Состав 1 доза содержит 80 или 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола или 320 мкг будесонида и 9 мкг формотерола.

Фармакологические свойства

В состав Симбикурта входят будесонид и формотерол, которые имеют разные механизмы действия и оказывают аддитивный эффект, снижая частоту обострений. Будесонид – глюкокортикостероид с дозозависимым противовоспалительным действием. Формотерол – селективный агонист β₂-адренергических рецепторов быстрого и длительного действия.

Показания к применению

Доза 320/9мкг и доза 160/4,5мкг:

Лечение пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) тяжелой степени (ОФВ1 < 50%), с часто повторяющимися обострениями в анамнезе. Лечение бронхиальной астмы в случаях, когда необходимо применение комбинации ингаляционного кортикостероида и β₂-агониста длительного действия.

Доза 80/4,5мкг:

Лечение бронхиальной астмы в случаях, когда необходимо применение комбинации ингаляционного кортикостероида и β₂-агониста длительного действия.

Способ применения и дозы

ХОЗЛ (взрослые):

Доза 320/9мкг: 1 ингаляция 2 раза в сутки.

Доза 160/4,5мкг: 2 ингаляции 2 раза в сутки.

Бронхиальная астма:

Поддерживающая терапия и купирование симптомов (только для доз 160/4,5мкг и 80/4,5мкг)

Взрослые (от 18 лет): поддерживающая доза составляет 1 ингаляция 2 раза в день утром и вечером, или 2 ингаляции утром или вечером. Некоторым пациентам может быть рекомендована поддерживающая доза 2 ингаляции 2 раза в день. При возникновении симптомов следует использовать дополнительную ингаляцию Симбикурта для их купирования. Если симптомы не прекращаются, следует использовать еще 1 ингаляцию. Не следует проводить более 6 ингаляций за один раз. Общая суточная доза не должна превышать 8 ингаляций, однако временно может быть использовано до 12 ингаляций в сутки.

Поддерживающая терапия:

Доза 320/9мкг:

Взрослые: 1-2 ингаляции два раза в день

Подростки (12-17 лет): 1 ингаляция два раза в день

Доза 160/4,5мкг и 80/4,5мкг:

Подростки (12-17 лет) и взрослые: 1-2 ингаляции два раза в день. Некоторым взрослым может понадобиться до 4 ингаляций два раза в день.

Доза 80/4,5мкг:

Дети (с 6 лет): 2 ингаляции два раза в день.

Побочные реакции. См. инструкцию по медицинскому применению.

Наиболее распространенные побочные явления: головная боль, тремор, кандидозы слизистой оболочки полости рта и глотки, умеренное раздражение в горле, кашель, орбитоптоз, ускоренное сердцебиение, тошнота, головокружение, мышечные судороги.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к будесониду, формотеролу или лактозе.

Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению.

Условия отпуска По рецепту.

Регистрационное свидетельство: UA/5433/01/01, UA/5433/01/02 и UA/5433/01/03 с

16.09.2011 по 16.09.2016 сроком на 5 лет.

Текст составлен согласно Инструкции по медицинскому применению, одобренных МЗ

Украины 16.09.2011 г.

За полной информацией обращайтесь в ООО «АстраЗенка Украина»

04050 г. Киев, ул. Пилипенко 13, тел. 391 52 82, факс 391 52 81

Симбикурт® Турбухалер® – торговые марки, собственность компании АстраЗенка

© AstraZeneca 2007-2013

Симбикурт®