

ТЕРАПІЯ ХОЗЛ* НА МАКСИМАЛЬНІЙ ГЛИБИНІ

Для пацієнтів із хронічним кашлем,
мокротою та високим ризиком загострень¹



Унікальний
протизапальний
механізм дії²



Зниження
частоти загострень³⁻⁴



Покращення
функції легенів⁵



1 таблетка на добу
додатково до підтримуючої
терапії першої лінії



NEW**
даксас
рофлуміласт

ПРАЦЮЮЧИ ГЛИБШЕ, РОБИТЬ БІЛЬШЕ

* – Хронічне обструктивне захворювання легенів; ** – Новий.

Діюча речовина. Roflumilast. **Лікарська форма.** Табл., вкриті плівкою оболонкою, по 500 мг рофлуміласту. **Фармакотерапевтична група.** Інгібітори фосфодіестерази-4 (PDE4). Код ATC R03D X07. **Показання.** Для підтримуючої терапії при хронічних обструктивних захворюваннях легень (ХОЗЛ) тяжкого перебігу (ОФВ₁ при застосуванні бронходилататорів менше 50% від належного), що пов'язані з хронічним бронхітом у дорослих та частими загостреннями в анамнезі, як додатковий засіб до бронходилатуючої терапії. **Фармакологічні властивості.** Рофлуміласт — інгібітор PDE4, нестероїдний протизапальний засіб, дія якого спрямовано на лікування системних і легеневих запальних процесів, пов'язаних з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ). Інгібування PDE4 призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня основного цАМФ і послаблення зв'язаніх з ХОЗЛ дисфункцій лейкоцитів, ендотеліальних і епітеліальних клітин дихальних шляхів, а також фібробластів в експериментальних зразках. **Побічні реакції.** Найчастіше: діарея (5,9%), зменшення маси тіла (3,4%), нудота (2,9%), біль у животі (1,9%), головний біль (1,7%), порушення сну. **Категорія відпуску.** За рецептом — 30 та 90 таблеток. **Р.п. МОЗ України:** №UA/11261/01/01 від 06.01.11. **Повна інформація** міститься в інструкції для медичного застосування препарату. **Інформація** для медичних та фармацевтичних працівників.

1. Burge PR et al. Chest 2009; 135: 975–982. 2. McEvoy RA. Eur Respir Rev 2007; 16: 105–112. 3. Hanania NA et al. Abstract accepted for ATS 2010. 4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Updated 2010. Available at www.GOLDcopd.com. 5. Fabbri LM et al. Lancet 2009; 374: 695–703.

ТОВ «Такеда Україна»: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 55Г,
тел.: (044) 390 0909, факс (044) 390 2929; www.takeda.ua

