

ЗІННАТ™

оригінальний цефуроксим аксетил

Має високу клінічну ефективність
при лікуванні респіраторних інфекцій¹

▶ Негоспітальна пневмонія	92%
▶ Тонзиліт	97%
▶ Синусит	89%
▶ Гострий середній отит	93%



P.C. МОЗ України НРUA/5509/02/01, НРUA/5509/02/02, НРUA/5509/01/01, НРUA/11807/01/01

Виготовлено в Барнард Кастл, Велика Британія² – центральне виробництво цефалоспоринів ГСК, що поставляє Зіннат для більшості країн світу, і України у т.ч.

Показання: лікування інфекцій дихальних шляхів, ЛОР-органів, сечовивідних шляхів, шкіри та м'яких тканин, гонореї, ранніх проявів хвороби Лайма. **Спосіб застосування і дози:** дорослі 250 мг двічі на день при більшості інфекцій, 125 мг двічі на день при інфекціях сечовивідних шляхів, 250 мг двічі на день для лікування пієлонефриту, 500 мг двічі на день при тяжких інфекціях. **Побічна дія** виражена помірно та має в основному зворотній характер: надмірний ріст *Candida*, еозинофілія, позитивний тест Кумбса, тромбоцитопенія, лейкопенія, гемолітична анемія, реакції гіперчутливості – шкірний висип, кропив'янка, свербіж, медикаментозна лихоманка, сироваткова хвороба, анафілаксія; головний біль, запаморочення, гастроентерологічні розлади, включаючи діарею, нудоту, біль у животі, блювоту; псевдомембранозний коліт, транзиторне підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛДГ), жовтяниця, гепатит; поліморфна еритема, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз. **Протипоказання:** підвищена чутливість до антибіотиків цефалоспоринового ряду. **Передозування:** можливе подразнення головного мозку і виникнення судом, усувається шляхом гемодіалізу і перитонеального діалізу. **Особливості застосування:** немає досвіду застосування у дітей до 3-х місяців. З обережністю призначається пацієнтам, у яких були алергічні реакції на бета-лактамі антибіотики. Під час лікування хвороби Лайма спостерігалась реакція Яриша-Герксгеймера, яка проходить без лікування. **Вагітність та лактація:** з обережністю призначається в перші місяці вагітності; цефуроксим виділяється з молоком матері, матері, що годують груддю повинні застосовувати його з обережністю.

З повною інформацією про препарат Ви можете ознайомитись в інструкції по застосуванню Р / с № UA/11807/01/01
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників

Повідомити про небажане явище або скаргу на якість препарату

Ви можете у ТОВ ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна за телефоном: (044) 585-51-85

* Упаковка в саше

1. Адаптовано з Lesley J. Scott et al. Cefuroxime axetil: an update review of its in the management of bacterial infections
Drugs 2001;61 (10): 1455 - 1500.

2. Інструкція для медичного застосування препарату Зіннат™