

Асманекс®[†] Твистхейлер®

(мометазона фураат, порошок для інгаляції)



**Доведений контроль астми
при застосуванні один раз на добу¹**



Простий у використанні інгалятор²



**Застосування один раз на добу
здатне покращити прихильність
пацієнтів до лікування³**

Інгаляційний глюкокортикоїд для контролю персистуючої бронхіальної астми легкого та середнього ступеню важкості у пацієнтів віком від 12 років⁴

Асманекс® (мометазона фураат) – протистматичний засіб, який застосовують інгаляційно. Глюкокортикоїд.
Показання. Бронхіальна астма будь-якого ступеня тяжкості, в тому числі гормонозалежна (пацієнти, які застосовують системні або інгаляційні кортикостероїди) і гормонезалежна (пацієнти, які не досягли достатнього контролю над хворобою, використовуючи інші схеми лікування без застосування

глюкокортикоїдів). Симптоматичне лікування хронічних обструктивних захворювань легень середнього та важкого ступеня.

Протипоказання. Підвищена чутливість до мометазону фураату або білків молока, які містяться в допоміжній речовині – лактозі.

Побічні реакції. Найпоширеніші побічні реакції – кандидоз порожнини рота, фарингіт, дисфонія та головний біль. Також під час клінічних досліджень зазви-

чай спостерігалися наступні побічні реакції: інфекція верхніх дихальних шляхів, дисменорея, біль у м'язах та кістках, біль у спині. Рідко може спостерігатися су-хість у роті та горлі, диспепсія, збільшення ваги та серцебиття.

Особливості застосування.* Асманекс® не призначений для швидкого купі-рування бронхоспазму. Слід попередити пацієнта, щоб він мав наготові швид-кодуючий інгаляційний бронхолітик для застосування у разі необхідності.

Джерела:

[†] Торгова марка Merck Sharp & Dohme Corp. 1. D'Urso A, Karpel JP, Busse WW et al. Efficacy and safety of mometazone furoate administered once-daily in the evening in patients with persistent asthma dependent on inhaled corticosteroids. *Curr Med Res Opin.* 2005;21(8):1281-9. 2. Wardlaw A, Larivee P, Eller J et al. Efficacy and safety of mometazone furoate dry powder inhaler vs fluticasone propionate metered-dose inhaler in asthma subjects previously using fluticasone propionate. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2004;93(1):49-55. 3. Friedman H et al. Adherence and asthma control with mometazone furoate versus fluticasone propionate in adolescents and young adults with asthma. *J Asthma* 2010; Early online 1-4. Інструкція для медичного застосування препарату Асманекс® pH NP UA-9025/01/01, UA-9025/01/02.

Матеріал призначений для спеціалізованої сфери охорони здоров'я і тільки для розповсюдження на спеціалізованих медичних заходах, або для публікації в спеціалізованих виданнях.

* Перед призначенням Асманексу®, будь-ласка, ознайомтесь з повною інструкцією по його застосуванню.

Асманекс® – торгова марка Merck Sharp & Dohme Corp
Авторські права ©2013 © ТОВ «МСД Україна». Всі права захищені. RSP-1081761-0000

Матеріал виготовлений: травень 2013
Матеріал придатний до: травень 2015

Якщо у Вас є питання по препаратам компанії MSD,
Ви можете звернутись до нас за адресою:

ТОВ «МСД Україна»
Адрес: Бізнес-центр «Горизонт-парк» 03038, Київ
вул. Амосова 12, 3 поверх, тел (044) 393-74-80, факс (044) 393-74-81.
medinfo@merck.com
www.msd.ua


