



# ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ



Информация о лекарственном препарате ИЗОНИЯЗИД. СОСТАВ: 1 мл сиропа содержит 20 мг изониазида. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Туберкулез (любой локализации), у взрослых и детей, лечение и профилактика, в составе комбинированной терапии. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, редко – необычная утомляемость или слабость, раздражительность, эйфория, бессонница, парестезии, периферическая нейропатия, неврит зрительного нерва, полиневрит, психозы, изменение настроения, депрессия. У больных эпилепсией могут учащаться припадки. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, стенокардия, повышение артериального давления. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, гастриты, токсический гепатит. Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, гипертермия, артралгии. Прочие: очень редко – тинимокания, меноррагии, склонности к кровотечениям и кровоизлияниям. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к препарату; лекарственный гепатит и печеночная недостаточность (на фоне предшествующего лечения) заболевания печени в стадии обострения. Информация о лекарственном препарате ИБУТОЛ. СОСТАВ: 1 мл раствора содержит 100 мг этимбутола гидрохлорида. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Лечение всех форм и локализации активного туберкулеза у взрослых и детей, особенно при впервые выявленных острых процессах. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможно развитие ретробульбарного невроза, ограничение поля зрения, нарушение остроты зрения и способности различать зеленый цвет; кровоизлияние в сетчатку; головокружение, головная боль, нервозность, диспептические явления, усиление кашля, затруднение отхождения мокроты и повышение ее вязкости. При длительном применении в больших дозах возможны поражение сердечной мышцы и развитие сердечной недостаточности, обострение подагры, лейкопения, аллергические реакции. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Индивидуальная непереносимость препарата; поражение зрительного нерва в анамнезе; подагра; катаракта; диабетическая ретинопатия, период лактации, терминальная стадия почечной недостаточности, возраст детей до 5 лет. Информация о лекарственном препарате РИФОНАТ. СОСТАВ: 1 мл концентрата содержит рифамидина натрия соли 30 мг. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Туберкулез различной локализации (все формы, в том числе туберкулезный менингит) в составе комбинированной терапии. Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами (в первую очередь стафилококками со множественной устойчивостью), в том числе: плеврит (в комбинации с флуорохинолонами), пилей заболевания; остеомиелит; пневмония; бронхит; отит; холангит; пикелендрит; менингококковый менингит; протрипантин у лиц, находившихся в тесном контакте с больными менингококковым менингитом; у бактерийоцистеля *Neisseria meningitidis*). ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. При ежедневном применении рифамидина его переносимость лучше, чем при интермиттирующем лечении. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита, эрозивный гастрит, повышение уровня печеночных трансаминаз, билирубина в плазме крови, псевдомембранозный энтероколит, гепатит. Со стороны системы кроветворения: редко – тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, эозинофилия, лейкопения, гемолитическая анемия. Со стороны ЦНС: головная боль, снижение остроты зрения, атаксия, нарушение координации движений, дезориентация. Со стороны мочевыделительной системы: нефроз почечных канальцев, интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность. Со стороны эндокринной системы: дисменорея. Аллергические реакции: крапивница, отек Квинке, бронхоспазм. Гриппоподобный синдром, артралгия, лихорадка, миалгия (при интермиттирующей или нерегулярной терапии или при возобновлении лечения после перерыва). Другие: красно-коричневая окраска мочи, чиха, слюны, мокроты, пота, слез, индукция порфирии, фиброз (при внутривенном введении). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к рифамидину или к другим компонентам препарата; желтуха; инфекционный гепатит, в том числе недавно перенесенный (более 1 года); хроническая почечная недостаточность; легочная недостаточность. II степени. Информация о лекарственном препарате ПАСКОНАТ. СОСТАВ: 100 мл раствора содержит натрия парааминосалицилат 3 г. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Активный, прогрессирующий, преимущественно фибринозно-кавернозный туберкулез легких, внепеченочный туберкулез различной локализации, который ранее неэффективно лечился сочетаниями различных противотуберкулезных препаратов. Для усиления лечебного эффекта при полимикробной терапии туберкулеза. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Наиболее часто встречаются желудочно-кишечные расстройства, ухудшение или потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, понос или запор. Могут наблюдаться аллергические реакции в виде крапивницы, пурпуры, эритемы, лихорадки, боли в суставах, астматические явления, эозинофилия. Продолжительный прием препарата может вызвать снижение концентрации калия плазмы и уровень pH, увеличение протромбинового времени и активности трансаминаз печени, нарушение баланса кальция и фосфора за счет нарушения обмена витамина D, развитие гемолитической анемии. Возможно появление боли и увеличение размера печени. Указанные явления, как правило, исчезают при уменьшении дозы либо кратковременной отмене введения препарата, они менее выражены при правильном трехразовом регулярном питании. При аллергических проявлениях назначают антигистаминные средства, кальций хлорид, аскорбиновую кислоту при запяных аллергических реакциях – кортикостероиды. Следует учитывать возможность появления гематом и фиброзов. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Внутривенное введение противопоказано при гепатите, нефрозе-нефрите, микседеме, сердечно-сосудистой недостаточности. II стадии, тяжелой атеросклерозе, тромбофлебитах, нарушении свертываемости крови. Из-за отсутствия данных о безопасности не следует назначать препарат в период беременности и кормления грудью. Изониазид сироп (100 мг/5мл), РС МОЗ Украины №УА/4567/01/01 от 14.07.2011. Ибутол (этимбутол гидрохлорид, 10% раствор для инфузий), РС МОЗ Украины №УА/4037901/01 от 03.08.2011. Рифонат (концентрат рифамидина 30 мг/мл для приготовления инфузионного раствора), РС МОЗ Украины №УА/11420/01/01 от 23.03.11. Пасконат (парааминосалициловая кислота, 3% раствор для инфузий), РС МОЗ Украины №УА/01320/01/01 от 15.03.2013. Информация для профессиональной деятельности медицинским и фармацевтическим работникам. Перед применением следует обязательно ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препаратов ИЗОНИЯЗИД, ИБУТОЛ, РИФОНАТ, ПАСКОНАТ и общими предостережениями. Макет разработан: ООО «Би-Брайт Медиа». Фото: Stockphoto

