

Эреспал®

фенспирид

Комплексное действие на воспаление¹

Лечение острых и хронических воспалительных процессов

- ХОЗЛ
- Дыхательных путей
- ЛОР органов

ДЕТИ:

Сироп

4 мг/кг (2 мл/кг) массы тела
в сутки

От 2 до 12 лет:

макс. суточная доза
120 мг (60 мл)

От 12 до 18 лет:

макс. суточная доза
180 мг (90 мл)

Противопоказание:

дети до 2-х лет

ВЗРОСЛЫЕ:

2-3 таблетки
в сутки



Сироп. 1 таблетка содержит 80 мг фенспирида гидрохлорида, 100 мл сиропа содержит 200 мг фенспирида гидрохлорида. **Фармакотерапевтическая группа.** Средства, действующие на респираторную систему. **Иные средства для системного воздействия при обструктивных заболеваниях респираторной системы.** Код АТХ R03D X03. **Показания.** Лечение острых и хронических воспалительных процессов ЛОР-органов и дыхательных путей (гит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит), хронический обструктивный бронхит, хронический воспалительный процесс бронхолегочной астмы. Сезонный и круглогодичный аллергический ринит и иные проявления аллергии с боку респираторной системы и ЛОР-органов. Респираторные проявления кори, гриппа. Симптоматическое лечение коклюша. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность (аллергия) до активной речевки либо до любого из компонентов препарата. Детский возраст до 2 лет. **Способ применения и дозы.** Таблетки. Рекомендовано застосування дорослим. Для перорального застосування. Застосовувати перед їдою. Зазвичай рекомендована терапевтична доза для лікування хронічних запальних процесів становить 2 таблетки на добу (ранці та ввечері). Для посилення ефекту їдою у разі гострих захворювань – 3 таблетки на добу (ранці, вдень і ввечері). **Сироп.** Добову дозу слід розподілити на 2-3 прийми та приймати перед їдою. Рекомендовану добову дозу слід призначати з урахуванням маси тіла та віку, але вона не повинна перевищувати рекомендовану добову дозу. Застосування дітям від 2 років. Рекомендована добова доза становить 4 мг/кг маси тіла (2 мл/кг). Якщо маса тіла менше 10 кг: добова доза становить від 2 до 4 чайних ложок сиропа (10-20 мл), відповідно 20-40 мг фенспириду гідрохлориду на добу. Застосування дорослим та дітям віком від 12 років. Добова доза сиропа становить від 3 до 6 столових ложок (45-90 мл), відповідно 90-180 мг фенспириду гідрохлориду на добу. **Побічні реакції.** Часті: Розлад травлення, нудота, біль у шлунку. Рідко: Сонливість, еритема, висипання, кропив'янка, ангіоедем, фіксована пелітена критика. Частота ниркової недостатності, помірної синусової тахікардії, яка зменшується після зняття дози; палітациа, вірогідно пов'язана з тахікардією; свербіж, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стивенса-Джонсона, астенія (слабкість), втома; артеріальна гіпотензія, вірогідно пов'язана з тахікардією; діарея, блювання. **Передозування.** Застосування у період вагітності або годування груддю. Дані щодо застосування фенспириду під час вагітності відсутні або обмежені. Тому застосовувати препарат у період вагітності не рекомендується, проте діагностування вагітності під час лікування фенспиридом не є приводом для припинення вагітності. Навіщо, чи проникає фенспирид у грудне молоко. Тому Ереспал® не слід застосовувати у період годування груддю. **Особливості застосування.** Таблетки. Лікування препаратом не замінює антибіотикотерапію. Сироп. До складу препарату входить сахароза, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози, недостатністю лактази Лаппа не рекомендовано призначати цей препарат. Пацієнтам із цукровим діабетом при застосуванні препарату Ереспал®, сироп, необхідно враховувати наступну інформацію: 1 чайна ложка препарату (5 мл) містить 3 г сахарози, відповідно одна столова ложка (15 мл сиропа) містить 9 г сахарози. Через наявність у складі препарату парабенів (метилпарагідроксibenzoat та пропілпарагідроксibenzoat) цей лікарський засіб може викликати алергічні реакції (ніколи не відстрочені). **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Оскільки препарат може викликати сонливість, то він має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, особливо на початку лікування або під час вживання алкоголю. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Одночасне застосування фенспириду та седативних препаратів або вживання алкоголю не рекомендовано. **Фармакологічні властивості.** Ереспал® має антибронхоконстрикторні та протизапальні властивості, зумовлені взаємодією кількох пов'язаних механізмів: блокування Н1-гістамінових рецепторів та спазмолітична дія на гладку мускулатуру бронхів, протизапальна дія, яка призводить до зменшення продукції різноманітних прозапальних факторів (цитокінів, TNF, похідних арахідонової кислоти, простагландинів, лейкотрієнів, тромбоксану, вільних радикалів), давка з них також чинить бронхоконстрикторну дію; інгібує α1-адренорецептори, які стимулюють секрецію в'язкого слизу. **Упаковка.** По 15 таблеток у блистері; по 2 блистери в картонній коробці. По 150 мл сиропа у флаконі коричневого кольору з поліетиленовою пробкою. По 1 флакону у коробці та картоні. **Категорія лікарського засобу.** За рецептом. **Виробник.** Laboratoire Servier S.A. Індустри, Франція/Les Laboratoires Servier Industrie, France. Детальна інформація викладена в інструкції для медичного застосування препарату ЕРЕСПАЛ® та ЕРЕСПАЛ® сироп. **Регістраційне посвідчення № UA/3703/02/01 01.09.2010 № 751 (ЕРЕСПАЛ®).** **Регістраційне посвідчення № UA/3703/01/01 01.09.2010 № 751 (ЕРЕСПАЛ® сироп).** Наказ МОЗ України 18.07.13 № 615.

1. Інструкція по медицинскому применению препарата.

Информация о лекарственном препарате для профессиональной деятельности специалистов здравоохранения.



Представительство Ле Лаборатуар Сервье в Украине:
01054, г. Киев, ул. Воровского, 24, Тел.: (044) 490-34-41,
факс: (044) 490-34-40

Для дополнительной информации посетите сайт:

www.servier.ua