

40% ПАЦІЄНТІВ З ХОЗЛ
«ЗАДИХАЮТЬСЯ»
У РАНКОВІ ГОДИНИ¹⁻³

СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР
ПОВЕРНЕ ДИХАННЯ
У РАНКОВІ ГОДИНИ

1 РАЗ НА ДОБУ СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР
НОВИЙ М-ХОЛІНОЛІТИК У ЛІКУВАННІ ХОЗЛ⁴



Склад: діюча речовина: глусоратіонію бромід; 1 капсула містить 63 мкг глікопіронію броміду, що відповідає 50 мкг глікопіронію, що еквівалентно 44 мкг цільової дози, що вивільняється; **допоміжні речовини. Лікарська форма.** Порошок для інгаляцій, капсули тверді. **Фармакотерапевтична група.** Інші протиастматичні засоби, що застосовуються інгаляційно. Антихолінергічні засоби. Код АТС R03B B06. **Показання.** Підтримувальна бронходилатаційна терапія для полегшення симптомів у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ). **Протипоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини, лактози або допоміжних речовин. **Спосіб застосування та дози.** Тільки для інгаляційного застосування. Рекомендована доза – інгаляція вмісту однієї капсули 50 мкг за допомогою інгалятора Сибрі Бризхайлер 1 раз на добу. Застосовують 1 раз на добу в один і той же час щодня. **Побічні реакції.** Часто: безсоння, сухість у роті, гастроентерит, та ін. Нечасто: риніт, синусит, гіперглікемія, гіпостезія, фібриляція передсердь, прискорене серцебиття, закладеність синусу, продуктивний кашель, подразнення горла, носова кровотеча, диспнея, висипання, біль у кінцівках, скелетно-м'язовий біль у грудях, та ін. **Фармакологічні властивості.** Сибрі Бризхайлер є антагоністом мускаринових рецепторів (антихолінергічна дія) тривалої дії. Він продемонстрував приблизно 4–5-кратну селективність до М3- та М1-рецепторів людини порівняно з М2-рецепторами людини у дослідженнях конкурентного зв'язування. Він має швидкий початок дії, про що свідчать кінетичні параметри асоціації/дисоціації препарату з відміченими рецепторами, та початок дії після інгаляції препарату. Довготривала дія препарату пов'язана зі стійкою концентрацією діючої речовини в легенях. Доклінічні дані не виявили будь-якої особливої небезпеки для людини. **Умови зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці. Термін придатності – 2 роки. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія. **Р.П. МОЗ України** №UA/13192/01/01 від 06.09.2013.

Інформація про характеристики та лікувальні властивості лікарського засобу для фахівців галузі охорони здоров'я.

Повна інформація про застосування препарату та повний перелік побічних реакцій містяться в інструкції для медичного застосування.

Дана інформація підлягає для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ і лікарів.

Поширення даної інформації будь-якими способами, що надають доступ до неї невизначеному колу осіб, заборонено. Затверджено: травень, 2014.

 **NOVARTIS**
PHARMACEUTICALS

1. Partridge M.R. et al // Curr. Med. Res. Opin. – 2009. – V. 25 (8). – P. 2043–2048.
2. Barnett M. et al // J. Clin. Nurs. – 2005. – V. 14 (7). – P. 805–812.
3. Kessler R. et al // Eur. Respir. J. – 2011. – V. 37 (2). – P. 264–272.
4. Інструкція для медичного застосування препарату Сибрі Бризхайлер.

ID code 256414/SEE/A4/05.14/1

Один Раз на Добу
сибрі
бризхайлер
глікопіронію бромід порошок для інгаляцій