

# Эреспал®

фенспирид

## Комплексное действие на воспаление<sup>1</sup>

### Лечение острых и хронических воспалительных процессов

- ХОЗЛ
- Дыхательных путей
- ЛОР органов

#### ДЕТИ:

##### Сироп

4 мг/кг (2 мл/кг) массы тела  
в сутки

##### От 2 до 12 лет:

макс. суточная доза  
120 мг (60 мл)

##### От 12 до 18 лет:

макс. суточная доза  
180 мг (90 мл)

##### Противопоказание:

дети до 2-х лет

#### ВЗРОСЛЫЕ:

2-3 таблетки  
в сутки



**Сироп<sup>1</sup>** 1 таблетка содержит 80 мг фенспириду гидрохлорида, 100 мл сиропа содержит 200 мг фенспириду гидрохлорида. **Фармакотерапевтическая группа<sup>1</sup>**. Средства, що діють на респіраторну систему. Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях респіраторної системи. Код АТХ R03D X03. **Показання<sup>1</sup>** Лікування гострих та хронічних запальних процесів ЛОР-органів та дихальних шляхів (гит, синусит, риніт, ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), у складі комплексної терапії бронхіальної астми. Сезонний та цілорічний алергічний риніт та інші прояви алергії з боку респіраторної системи та ЛОР-органів. Респіраторні прояви кори, грипу. Симптоматичне лікування коклюшу. **Протипоказання<sup>1</sup>** Підвищена чутливість (алергія) до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату. Дитячий вік до 2 років. **Спосіб застосування та дози<sup>1</sup>** Таблетки. Рекомендовано застосовувати дорослим. Для перорального застосування. Застосовувати перед їдою. Зазвичай рекомендована терапевтична доза для лікування хронічних запальних процесів становить 2 таблетки на добу (вранці та ввечері). Для посилення ефекту 1 або у разі гострих захворювань – 3 таблетки на добу (вранці, вдень і ввечері). Сироп. Добову дозу слід розподілити на 2-3 прийми та приймати перед їдою. Рекомендовану добову дозу слід призначати з урахуванням маси тіла та віку, але вона не повинна перевищувати рекомендовану добову дозу. Застосування дітям від 2 років. Рекомендована добова доза становить 4 мг/кг маси тіла (2 мл/кг). Якщо маса тіла менше 10 кг: добова доза становить від 2 до 4 чайних ложок сиропу (10-20 мл), відповідно 20-40 мг фенспириду гидрохлорида на добу. Якщо маса тіла понад 10 кг: добова доза становить від 2 до 4 столових ложок сиропу (30-60 мл), відповідно 60-120 мг фенспириду гидрохлорида на добу. Застосування дорослим та дітям віком від 12 років. Добова доза сиропу становить від 3 до 6 столових ложок (45-90 мл), відповідно 90-180 мг фенспириду гидрохлорида на добу. **Біобіо реакції<sup>1</sup>** Часті: Розлади травлення, нудота, біль у шлунку. Рідко: Сонливість, втрата ваги, виснаження, кров'яні зливи, ангіоедем, фіксована пелітента критика. Частота невідомо: Замороження, помірні синусова тахікардія, яка зменшується після зняття дози; палітатція, вірогідно пов'язана з тахікардією; свербіж, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стивенса-Джонсона, астенія (слабкість), втома; артеріальна гіпотензія, вірогідно пов'язана з тахікардією; діарея, блювання. **Передозування<sup>1</sup>** Застосування у період вагітності або годування груддю<sup>1</sup> Дані щодо застосування фенспириду під час вагітності відсутні або обмежені. Тому застосовувати препарат у період вагітності не рекомендується, проте діагностування вагітності під час лікування фенспиридом не є приводом для припинення вагітності. Невідомо, чи проникає фенспирид у грудне молоко. Тому Ереспал® не слід застосовувати у період годування груддю. **Особливості застосування<sup>1</sup>** Таблетки. Лікування препаратом на замовні антибіотикотерапії. Сироп. До складу препарату входить сахароза, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози, недостатністю лактази Лаппа не рекомендовано призначати цей препарат. Пацієнтам із цукровим діабетом при застосуванні препарату Ереспал®, сироп, необхідно враховувати наступну інформацію: 1 чайна ложка препарату (5 мл) містить 3 г сахарози, відповідно одна столова ложка (15 мл сиропу) містить 9 г сахарози. Через наявність у складі препарату парабенів (метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат) цей лікарський засіб може викликати алергічні реакції (можливо відстрочені). **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами<sup>1</sup>** Оскільки препарат може викликати сонливість, то він має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, особливо на початку лікування або під час вживання алкоголю. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій<sup>1</sup>** Одночасне застосування фенспириду та седативних препаратів або вживання алкоголю не рекомендовано. **Фармакологічні властивості<sup>1</sup>** Ереспал® має антибронхоконстрикторні та протизапальні властивості, зумовлені взаємодією кількох пов'язаних механізмів: блокування Н<sub>1</sub>-гістамінових рецепторів та спазмолітична дія на гладку мускулатуру бронхів; протизапальна дія, яка призводить до зменшення продукції різноманітних прозапальних факторів (цитокінів, TNF, похідних арахідонової кислоти, простагландинів, лейкотрієнів, триптоксану, вільних радикалів), деякі з них також чинять бронхоконстрикторну дію; інгібує епідермальні фактори, які стимулюють секрецію в'язкого слизу. **Упаковка<sup>1</sup>** По 15 таблеток у блистері; по 2 блистери в картонній коробці. По 150 мл сиропу у флаконі корінняного кольору з поліпропіленовою пробкою. По 1 флакону у коробці з картоном. **Категорія відпуску<sup>1</sup>** За рецептом. **Виробник<sup>1</sup>** Лаботорі Сервіс Індустрі, Франція/Les Laboratoires Servier Industrie, France. Детальна інформація викладена в інструкції для медичного застосування препарату Ереспал® та Ереспал® сироп. **Реєстраційне посвідчення № UA/3703/02/01 01.09.2010 № 751 (Ереспал®).** **Реєстраційне посвідчення № UA/3703/01/01 01.09.2010 № 751 (Ереспал® сироп).** Наказ МОЗ України 18.07.13 № 615.

1. Інструкція по медичному використанню препарату.  
Інформація о лекарственном препарате для профессиональной деятельности специалистов здравоохранения.



Представительство Ле Лаботоруар Сервье в Украине:  
01054, г. Киев, ул. Воровского, 24, Тел.: (044) 490-34-41,  
факс: (044) 490-34-40  
Для дополнительной информации посетите сайт:  
[www.servier.ua](http://www.servier.ua)