



ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ



Информация о лекарственном препарате **ИЗОНАЗИД**. СОСТАВ: 1 мл сиропа содержит 20 мг изониазида. **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**. Туберкулез (любой локализации), у взрослых и детей, лечение и профилактика, в составе комбинированной терапии. **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**. Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, редко – необычная утомляемость или слабость, раздражительность, эйфория, бессонница, парестезии, периферическая нейропатия, неврит зрительного нерва, полиневрит, психозы, изменение настроения, депрессия. У больных эпилепсией могут учащаться припадки. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, стенокардия, повышение артериального давления. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, гастриты, токсический гепатит. Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, гипертермия, артралгии. Прочие: очень редко – тинитомия, меноррагии, склонности к кровотечениям и кровоизлияниям. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**. Повышенная чувствительность к препарату; лекарственный гепатит и печеночная недостаточность (на фоне предшествующего лечения) заболевания печени в стадии обострения. Информация о лекарственном препарате **ИНБУТОЛ**. СОСТАВ: 1 мл раствора содержит 100 мг этимбулола гидрохлорида. **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**. Лечение всех форм и локализации активного туберкулеза у взрослых и детей, особенно при впервые выявленных острых процессах. **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**. Возможно развитие ретробульбарного невроза, ограничение поля зрения, нарушение остроты зрения и способности различать зеленый цвет; кровоизлияние в сетчатку; головкружение, головная боль, гирстезии, диспептические явления, усиление кашля, затруднение отхождения мокроты и повышение ее вязкости. При длительном применении в больших дозах возможны поражение сердечной мышцы и развитие сердечной недостаточности, обострение подагры, лейкопения, аллергические реакции. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**. Индивидуальная непереносимость препарата; поражение зрительного нерва в анамнезе; подагра, катаракта, диабетическая ретинопатия, период лактации, терминальная стадия почечной недостаточности, возраст детей до 5 лет. Информация о лекарственном препарате **РИФОНАТ**. СОСТАВ: 1 мл концентрата содержит рифамидина натрия соли 30 мг. **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**. Туберкулез различной локализации (все формы, в том числе туберкулезный менингит) в составе комбинированной терапии. Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами (в первую очередь стафилококками со множественной устойчивостью), в том числе: плеврит (в комбинации с флуорокимолонидолизиневыми или фторхинолоновыми препаратами); остеомиелит; пневмония; бронхит; отит; холангит; пилефист; менингококковый менингит; паратификоз у лиц, находившихся в тесном контакте с больными менингококковым менингитом; у бациллоносителей *Neisseria meningitidis*. **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**. При ежедневном применении рифамидина его переносимость лучше, чем при интермиттирующем лечении. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита, эрозивный гастрит, повышение уровня печеночных трансаминаз, билирубина в плазме крови, псевдомембранозный энтероколит, гепатит. Со стороны системы кроветворения: редко – тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, эозинофилия, лейкопения, гемолитическая анемия. Со стороны ЦНС: головная боль, снижение остроты зрения, атаксия, нарушение координации движений, дезориентация. Со стороны мочевыделительной системы: нефроз почечных канальцев, интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность. Со стороны эндокринной системы: дисменорея. Аллергические реакции: крапивница, отек Квинке, бронхоспазм. Гриппоподобный синдром, артралгия, лихорадка, миалгия (при интермиттирующей или нерегулярной терапии или при возобновлении лечения после перерыва). Другие: красно-коричневая окраска мочи, жала, слюны, мокроты, пота, слез, индукция порфирии, фиброз (при внутривенном введении). **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**. Повышенная чувствительность к рифамидину или к другим компонентам препарата; желтуха; инфекционный гепатит, в том числе недавно перенесенный (более 1 года); хроническая почечная недостаточность; легочное сердце; недостаточность I-II степени. Информация о лекарственном препарате **ПАСКОНАТ**. СОСТАВ: 100 мл раствора содержит натрия парааминосалицилат 3 г. **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**. Активный, прогрессирующий, преимущественно фибринозно-кавернозный туберкулез легких, внеочередной туберкулез различной локализации, который ранее неэффективно лечился сочетаниями различных противотуберкулезных препаратов. Для усиления лечебного эффекта при полимикротерапии туберкулеза. **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**. Наиболее часто случаются желудочно-кишечные расстройства, ухудшение или потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, понос или запор. Могут наблюдаться аллергические реакции в виде крапивницы, пурпуры, эритемы, лихорадки, боли в суставах, астматические явления, эозинофилия. Продолжительный прием препарата может вызвать снижение концентрации калия плазмы и уровень pH, увеличение протромбинового времени и активности трансаминаз печени, нарушение баланса кальция и фосфора за счет нарушения обмена витамина D, развитие гемолитической анемии. Возможно появление боли и увеличение размера печени. Указанные явления, как правило, исчезают при уменьшении дозы либо кратковременной отмене введения препарата, они менее выражены при правильном туберкулезном и регулярном питании. При аллергических проявлениях назначают антигистаминные средства, кальций хлорид, аскорбиновую кислоту при запяных аллергических реакциях – кортикостероиды. Следует учитывать возможность появления гематом и фиброзов. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**. Внутривенное введение противопоказано при гепатите, нефрозе-нефрите, микседеме, сердечно-сосудистой недостаточности I-II стадии, тяжелой атеросклерозе, тромбофлебитах, нарушении свертываемости крови. Из-за отсутствия данных о безопасности не следует назначать препарат в период беременности и кормления грудью. **ИЗОНАЗИД** сироп (100 мг/5мл), РС МОЗ Украины №УА/4567/01/01 от 14.07.2011. **ИНБУТОЛ** (этимбулол гидрохлорид, 10% раствор для инфузий), РС МОЗ Украины №УА/4037901/01 от 03.08.2011. **Рифонат** (концентрат рифамидина 30 мг/мл для приготовления инфузионного раствора), РС МОЗ Украины №УА/11420/01/01 от 23.03.11. **Пасконат** (парааминосалициловая кислота, 3% раствор для инфузий), РС МОЗ Украины №УА/01320/01/01 от 15.03.2013. Информация для профессиональной деятельности медицинским и фармацевтическим работникам. Перед применением следует обязательно ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препаратов **ИЗОНАЗИД**, **ИНБУТОЛ**, **РИФОНАТ**, **ПАСКОНАТ** и общими предостережениями. Макет разработан: ООО «Би-Брайт Медиа». Фото: Stockphoto

