

І. Ю. Осійський, А. Ю. Циганков, Л. В. Колосюк, О. М. Краснов

«ОКРУГЛІ» УТВОРЕННЯ В ЛЕГЕНЯХ У ХВОРИХ У ФТИЗІОХІРУРГІЧНІЙ КЛІНІЦІ

*Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія»*

«Округлі» утворення в легенях складають більше 20 % серед пульмонологічних хворих та виникають при 110 легене-вих хворобах. У більшості пацієнтів з «округлими» утвореннями в легенях діагноз верифікується після операцій.

У фтизіохірургічній клініці з 1980 року обстежено 654 хворих з «округлими» утвореннями в легенях. У 594 пацієнтів (92 %) виконано хірургічне лікування. Серед них було чоловіків — 386 (65 %), жінок — 208 (35 %) у віці від 17 до 70 років. По прямим показам виконано оперативні втручання у 96 % та по розширеному — у 4 % хворих.

Сегментектомії, в т.ч. і «прецизійні», виконано у 209 (35,2 %) пацієнтів, полісегментарні резекції — у 238 (40,1 %), лобектомії — у 116 (19,5 %), білобектомії справа — у 18 (3,0 %), пневмонектомії — у 3 (0,5 %), видалення пухлини середостіння — у

3 (0,5 %), видалення ціломічної кисти перикарду — у 7 (1,2 %).

Після цитологічного та гістологічного дослідження операційного матеріалу виявлено: туберкуломи — у 489 чол. (82,4 %), рак легень — у 31 (5,2 %), абсцеси легень — у 6 (1,0 %), ехінококові кисти — у 8 (1,3 %), доброякісні пухлини легень — у 28 (4,7%), вторинні аспергіломи — у 18 (3,0 %), пухлини середостіння — у 10 (1,7 %), ціломічні кисти перикарду — у 4 (0,7 %).

У всіх хворих з туберкуломами в мазках бактеріоскопічно та бактеріологічно виявлялись мікобактерії туберкульозу, чутливі до основних антимікобактеріальних препаратів.

Післяопераційний період у оперованих перебігав без серйозних ускладнень. Всі пацієнти виписані в доброго та задовільного стані.

Таким чином, ефективність хірургічного лікування хворих з «округлими» утвореннями в легенях складає 100 %.