

ДЕКАСАН®

Decamethoxine



ПЕРВЫЙ ингаляционный антисептик



Схемы лечения ингаляционным Декасаном

ЗАБОЛЕВАНИЯ:	ДОЗА в мл	КРАТНОСТЬ И МЕТОД ИНГАЛЯЦИИ
верхних дыхательных путей	2-4 мл (1-2 однодозовых контейнера)	2-4 раза в день в течение 7-10 дней через назальную канюлю или маску
нижних дыхательных путей		2-4 раза в день в течение 7-10 дней через загубник

Для детей до 12 лет перед ингаляцией содержимое небулайзерной камеры (2-4 мл Декасана) необходимо развести в 2 мл стерильного 0,9% изотонического натрия хлорида (однодозовые контейнеры по 2 мл).

Информация о лекарственном препарате ДЕКАСАН®. Состав: 1мл раствора содержит 0,2 мг декаметоксина. Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A. Показания к применению. Лечение гнойничковых бактериальных и грибковых заболеваний кожи, микробной экземы, гнойно-воспалительных поражений мягких тканей (абсцессы, карбункулы, флегмоны, фурункулы, нагноившиеся раны, панариции); стоматологические заболевания (стоматиты, язвенно-некротический гингивит, дистрофически-воспалительная форма пародонтоза II степени в стадии обострения). Показан при абсцессе легких, бронхоэктатической болезни, кистой гипоплазии легких, осложненной нагноением, хроническом бронхите в фазе обострения, хроническом тонзиллите, ангине, носительстве стафилококков и дифтерийных палочек, язвенном колите, парапроктите. В гинекологической практике – для лечения кандидоза слизистой влагалища, воспалительных заболеваний гениталий микробного происхождения, предродовой санации родовых путей, лечения послеродового эндометрита. Гигиеническая дезинфекция кожи рук медперсонала и резиновых перчаток во время обследования больных, проведения медицинских манипуляций и малых хирургических вмешательств, предстерилизационной дезинфекции медицинских инструментов и диагностического оборудования из металлов, резины, полимерных материалов и стекла. Побочное действие. В единичных случаях возможна индивидуальная гиперчувствительность. У таких лиц возможно появление сыпи на коже после применения препарата; при эндобронхиальном введении ощущение жара за грудной, которое проходит самостоятельно через 20-30 мин после окончания процедуры. Противопоказания. Индивидуальная гиперчувствительность к препарату. Передозировка. В связи с отсутствием всасывания передозировка не наблюдается. Условия отпуска. Без рецепта. Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. РС МОЗ Украины № УА/5364/01/01 от 03.01.12. Перед использованием необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению и общими предостережениями. Хранить в недоступном для детей месте. Макет разработан: ООО «Би-Брайт Медиа». Фото: Shutterstock.com

