

40% ПАЦІЄНТІВ З ХОЗЛ
«ЗАДИХАЮТЬСЯ»
У РАНКОВІ ГОДИНИ¹⁻³

СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР
ПОВЕРНЕ ДИХАННЯ
У РАНКОВІ ГОДИНИ

1 РАЗ НА ДОБУ СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР
М-ХОЛІНОЛІТИК ШВИДКОЇ ТА ТРИВАЛОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХОЗЛ



Склад: діюча речовина: глусорупіоніюм бромід; 1 капсула містить 63 мкг глікопіронію броміду, що відповідає 50 мкг глікопіронію, що еквівалентно 44 мкг цільової дози, що вивільняється; допоміжні речовини. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляцій, капсули тверді. **Фармакотерапевтична група.** Інші протиастматичні засоби, що застосовуються інгаляційно. Антихолінергічні засоби. Код АТС R03B B06. **Показання.** Підтримувальна бронходилататорна терапія для полегшення симптомів у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ). **Протипоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини, лактози або допоміжних речовин. **Спосіб застосування та дози.** Тільки для інгаляційного застосування. Рекомендована доза – інгаляція вмісту однієї капсули 50 мкг за допомогою інгалятора Сибрі Бризхайлер 1 раз на добу. Застосовують 1 раз на добу в один і той же час щодня. **Побічні реакції.** Часто: безсоння, сухість у роті, гастроентерит, та ін. Нечасто: риніт, синусит, гіперглікемія, гіпостезія, фібриляція передсердь, прискорене серцебиття, закладеність синусу, продуктивний кашель, подразнення горла, носова кровотеча, диспепсія, висипання, біль у кінцівках, скелетно-м'язовий біль у грудях, та ін. **Фармакологічні властивості.** Сибрі Бризхайлер є антагоністом мускаринових рецепторів (антихолінергічна дія) тривалої дії. Він продемонстрував приблизно 4–5-кратну селективність до М3- та М1-рецепторів людини порівняно з М2-рецепторами людини у дослідженнях конкурентного зв'язування. Він має швидкий початок дії, про що свідчать кінетичні параметри асоціації/дисоціації препарату з відміченими рецепторами, та початок дії після інгаляції препарату. Довготривала дія препарату пов'язана зі стійкою концентрацією діючої речовини в легенях. Доклінічні дані не виявили будь-якої особливої небезпеки для людини. **Умови зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці. Термін придатності – 2 роки. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія. Р.П. МОЗ України №UA/13192/01/01 від 06.09.2013.

Інформація про характеристики та лікувальні властивості лікарського засобу для фахівців галузі охорони здоров'я.

Повна інформація про застосування препарату та повний перелік побічних реакцій містяться в інструкції для медичного застосування.

Дана інформація підлягає для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ і лікарів.

Поширення даної інформації будь-якими способами, що надають доступ до неї невизначеному колу осіб, заборонено.