

ТЕПЕРЬ ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХОЗЛ



	80/4,5	160/4,5	320/9
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: базисная терапия*	✓	✓	✓
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: базисная терапия* + купирование симптомов**	✓	✓	
ХОЗЛ		✓	✓

* У детей 6 лет и старше – только доза 80/4,5 мг, у подростков с 12 лет и взрослых – дозы 160/4,5 мг и 320/9 мг.

** Только у взрослых старше 18 лет.

Краткая информация о применении препарата Симбикорт Турбухалер (порошок для ингаляций дозированных)

Состав: 1 доза содержит 80 или 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола или 320 мкг будесонида и 9 мкг формотерола. **Фармакологические свойства.** В состав Симбикорта входят будесонид и формотерол, которые имеют разные механизмы действия и оказывают аддитивный эффект, снижая частоту обострений. Будесонид — глюкокортикостероид с дозозависимым противовоспалительным действием. Формотерол — селективный агонист β_2 -адренергических рецепторов быстрого и длительного действия. **Показания к применению.** Доза 320/9 мкг и доза 160/4,5 мкг: лечение пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) тяжелой степени (ОФВ₁ < 50%), с часто повторяющимися обострениями в анамнезе; лечение бронхиальной астмы в случаях, когда необходимо применение комбинации ингаляционного кортикостероида и β_2 -агониста длительного действия. Доза 80/4,5 мкг: лечение бронхиальной астмы в случаях, когда необходимо применение комбинации ингаляционного кортикостероида и β_2 -агониста длительного действия. **Способ применения и дозы.** ХОЗЛ (взрослые): Доза 320/9 мкг: 1 ингаляция 2 раза в сутки. Доза 160/4,5 мкг: 2 ингаляции 2 раза в сутки. Бронхиальная астма: Поддерживающая терапия и купирование симптомов (только для доз 160/4,5 мкг и 80/4,5 мкг). Взрослые (от 18 лет): поддерживающая доза составляет 1 ингаляцию 2 раза в день утром и вечером, или 2 ингаляции утром или вечером. Некоторым пациентам может быть рекомендована поддерживающая доза 2 ингаляции 2 раза в день. При возникновении симптомов следует использовать дополнительную ингаляцию Симбикорта для их купирования. Если симптомы не прекращаются, следует использовать еще 1 ингаляцию. Не следует проводить более

6 ингаляций за один раз. Общая суточная доза не должна превышать 8 ингаляций, однако временно может быть использовано до 12 ингаляций в сутки. **Поддерживающая терапия.** Доза 320/9 мкг: Взрослые: 1–2 ингаляции два раза в день. Подростки (12–17 лет): 1 ингаляция два раза в день. Доза 160/4,5 мкг и 80/4,5 мкг: Подростки (12–17 лет) и взрослые: 1–2 ингаляции два раза в день. Некоторым взрослым может понадобиться до 4 ингаляций два раза в день. Доза 80/4,5 мкг: Дети (с 6 лет): 2 ингаляции два раза в день. **Побочные реакции.** См. инструкцию по медицинскому применению. Наиболее распространенные побочные явления: головная боль, тремор, кандидозы слизистой оболочки полости рта и глотки, умеренное раздражение в горле, кашель, охриплость, ускоренное сердцебиение, тошнота, головокружение, мышечные судороги. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к будесониду, формотеролу или лактозе. **Условия отпуска.** По рецепту. **Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению. Если у Вас, у Вашего пациента, родственника был случай возникновения нежелательного явления (напр. побочной реакции) или случай отсутствия эффекта/эффективности на какой-либо из продуктов компании АстраЗенека, пожалуйста, сообщите об этом в компанию АстраЗенека по телефону: +38 (044)3915282 (спросить ответственного за фармаконадзор) или по эл. почте: PatientSafety.Ukraine@astrazeneca.com.** Регистрационные свидетельства: UA/5433/01/01, UA/5433/01/02 и UA/5433/01/03 с 16.09.2011 по 16.09.2016 сроком на 5 лет. Текст составлен согласно Инструкции по медицинскому применению, одобренным МЗ Украины 16.09.2011 г. Дата последнего пересмотра 12.01.2015.

За полной информацией обращайтесь в ООО «АстраЗенека Украина». 04050 г. Киев, ул. Пимоненко, 13, тел. 3915282, факс 3915281. Эта информация для врачей. Предназначено только для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике, а также для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей. Симбикорт Турбухалер — торговые марки, собственность компании АстраЗенека. © AstraZeneca 2007–2015.

Симбикорт