

40% ПАЦІЄНТІВ З ХОЗЛ
«ЗАДИХАЮТЬСЯ»
У РАНКОВІ ГОДИНИ¹⁻³

СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР
ПОВЕРНЕ ДИХАННЯ
У РАНКОВІ ГОДИНИ

1 РАЗ НА ДОБУ СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР
М-ХОЛІНОЛІТИК ШВИДКОЇ ТА ТРИВАЛОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХОЗЛ



Склад: діюча речовина: глусоруголіум бромід; 1 капсула містить 63 мкг глікопіронію броміду, що відповідає 50 мкг глікопіронію, що еквівалентно 44 мкг цільової дози, що вивільняється; допоміжні речовини. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляцій, капсули тверді. **Фармакотерапевтична група.** Інші протиастиматичні засоби, що застосовуються інгаляційно. Антихолінергічні засоби. Код АТС R03B B06. **Показання.** Підтримувальна бронходилатативна терапія для полегшення симптомів у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ). **Протипоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини, лактози або допоміжних речовин. **Спосіб застосування та дози.** Тільки для інгаляційного застосування. Рекомендована доза - інгаляція вмісту однієї капсули 50 мкг за допомогою інгалятора Сибрі Бризхайлер 1 раз на добу. Застосовують 1 раз на добу в один і той же час щодня. **Побічні реакції.** Часто: безсоння, сухість у роті, гастроентерит, та ін. **Нечасто:** риніт, синусит, гіперглікемія, гіпостезія, фібриляція передсердь, прискорене серцебиття, закладеність синусу, продуктивний кашель, подразнення горла, носова кровотеча, диспепсія, висипання, біль у кінцівках, скелетно-м'язовий біль у грудях, та ін. **Фармакологічні властивості.** Сибрі Бризхайлер є антагоністом мускаринових рецепторів (антихолінергічна дія) тривалої дії. Він продемонстрував приблизно 4-5-кратну селективність до М3- та М1-рецепторів людини порівняно з М2-рецепторами людини у дослідженнях конкурентного зв'язування. Він має швидкий початок дії, про що свідчать кінетичні параметри асоціації/дисоціації препарату з відміченими рецепторами, та початок дії після інгаляції препарату. Довготривала дія препарату пов'язана зі стійкою концентрацією діючої речовини в легенях. Доклінічні дані не виявили будь-якої особливої небезпеки для людини. **Умови зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці. Термін придатності - 2 роки. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія. **Р.П. МОЗ України** №УА/13192/01/01 від 06.09.2013.

Інформація про характеристики та лікувальні властивості лікарського засобу для фахівців галузі охорони здоров'я.
Повна інформація про застосування препарату та повний перелік побічних реакцій містяться в Інструкції для медичного застосування.
Дана інформація підлягає для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ і лікарів.
Поширення даної інформації будь-якими способами, що надають доступ до неї невизначеному колу осіб, заборонено.

 **NOVARTIS**
PHARMACEUTICALS

1. Partridge M.R. et al // Curr. Med. Res. Opin. - 2009. - V. 25 (8). - P. 2043-2048.
2. Barnett M. et al // J. Clin. Nurs. - 2005. - V. 14 (7). - P. 805-812.
3. Kessler R. et al // Eur. Respir. J. - 2011. - V. 37 (2). - P. 264-272.
4. Інструкція для медичного застосування препарату Сибрі Бризхайлер.

ID code: 355828/SEE/A4/02.2015/1000

Один Раз на Добу
сибрі
бризхайлер
глікопіронію бромід порошок для інгаляцій