ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Информация о лекарственном препарате ИЗОНИАЗИД®. СОСТАВ: 1 мл сиропа содержит 20 мг изониазида. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Туберкулез (любой локализации, у взрослых и детей, лечение и профилактика, в составе комбинированной терапии). ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, редко - необычайная утомляемость или слабость, раздражительность, эйфория, бессонница, парестезии, онемение конечностей, периферическая нейропатия, неврит зрительного нерва, полиневрит, психозы, изменение настроения, депрессия. У больных эпилепсией могут учащаться припадки. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, стенокардия, повышение артериального давления. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, гастралгия, токсический гепатит. Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, гипертермия, артралгия. Прочие: очень редко - гинекомастия, меноррагия, склонность к кровотечениям и кровоизлияниям. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к препарату; лекарственный гепатит и печеночная недостаточность (на фоне предшествующего лечения); заболевания печени в стадии обострения. Информация о лекарственном препарате ИНБУТОЛ®. СОСТАВ: 1 мл раствора содержит 100 мг этамбутола гидрохлорида. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Лечение всех форм и локализации активного туберкулеза у взрослых и детей, особенно при впервые выявленных острых процессах. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможно развитие ретробульбарного невроза, ограничение полей зрения, нарушение остроты зрения и способности различать зеленый цвет, кровоизлияние в сетчатку, головокружение, головная боль, парестезии, диспептические явления, усиление кашля, затруднение отхождения мокроты и повышение ее вязкости. При длительном применении в больших дозах возможны поражение сердечной мышцы и развитие сердечной недостаточности, обострение подагры, лейкопения, аллергические реакции. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Индивидуальная непереносимость препарата, поражения зрительного нерва в анамнезе, подагра, катаракта, диабетическая ретинопатия, период лактации, терминальная стадия почечной недостаточности, возраст детей до 5 лет. Информация о лекарственном препарате РИФОНАТ®. СОСТАВ: 1 мл концентрата содержит рифамицина натриевой соли 30 мг. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Туберкулез различной локализации (все формы, в том числе туберкулезный менингит) в составе комбинированной терапии. Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами (в первую очередь стафилококками со множественной устойчивостью), в том числе: лепра (в комбинации с дапсоном-мультибациллярные типы заболевания); остеомиелит: пневмония, бронхит; отит; холецистит; пиелонефрит; менингококковый менингит (профилактика у лиц, находившихся в тесном контакте с больными менингококковым менингитом; у бациллоносителей Neisseria meningitidis). ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. При ежедневном применении рифамицина его переносимость лучше, чем при интермиттирующем лечении. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита, эрозивный гастрит, повышение уровня печеночных трансаминаз, билирубина в плазме крови, псевдомембранозный энтероколит, гепатит. Со стороны системы кроветворения: редко - тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, эозинофилия, лейкопения, гемолитическая анемия. Со стороны ЦНС: головная боль, снижение остроты зрения, атаксия, нарушение координации движений, дезориентация. Со стороны мочевыводящей системы: некроз почечных канальцев, интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность. Со стороны эндокринной системы: дисменорея. Аллергические реакции: крапивница, отек Квинке, бронхоспазм. Гриппоподобный синдром: артралгия, лихорадка, миалгия (при интермиттирующей или нерегулярной терапии или при возобновлении лечения после перерыва). Другие: красно-коричневая окраска мочи, кала, слюны, мокроты, пота, слез, индукция порфирии, флебит (при внутривенном введении). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к рифамицину или к другим компонентам препарата; желтуха; инфекционный гепатит, в том числе недавно перенесенный (менее 1 года); хроническая почечная недостаточность; легочно-сердечная недостаточность II - III степени. Информация о лекарственном препарате ПАСКОНАТ®. СОСТАВ: 100 мл раствора содержат натрия парааминосалицилата 3 г. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Активный, прогрессирующий, преимущественно фиброзно-кавернозный туберкулез легких, внелегочной туберкулез различной локализации, который ранее неэффективно лечился сочетаниями различных противотуберкулезных препаратов. Для усиления лечебного эффекта при полихимиотерапии туберкулеза. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Наиболее часто случаются желудочно-кишечные расстройства, ухудшение или потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, понос или запор. Могут наблюдаться аллергические реакции в виде крапивницы, пурпуры, энантемы, лихорадки, боли в суставах, астматические явления, эозинофилии. Продолжительный прием препарата может вызвать снижение концентрации калия плазмы и уровень pH, увеличение протромбинового времени и активности трансаминаз печени, нарушение баланса кальция и фосфора за счет нарушения обмена витамина D, развитие гемолитической анемии. Возможно появление боли и увеличение размера печени. Указанные явления, как правило, исчезают при уменьшении дозы либо кратковременной отмене введения препарата, они менее выражены при правильном трехразовом регулярном питании. При аллергических проявлениях назначают антигистаминные средства, кальция хлорид, кислоту аскорбиновую, при затяжных аллергических реакциях – кортикостероиды. Следует учитывать возможность появления гематом и флебитов. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Внутривенное введение противопоказано при гепатитах, нефрозо-нефритах, микседеме, сердечно-сосудистой недостаточности II-III стадии, тяжелом атеросклерозе, тромбофлебитах, нарушении свертывания крови. Из-за отсутствия данных о безопасности не следует назначать препарат в период беременности и кормления грудью. Изониазид сироп (100 мг/5мл). РС МОЗ Украины №UA/4567/01/01 от 14.07.2011. Инбутол (этамбутол гидрохлорид, 10% раствор для инфузий). РС МОЗ Украины №UA/4798/01/01 от 03.08.2011. Рифонат (концентрат рифамицина 30 мг/мл для приготовления инфузионного раствора). РС МОЗ Украины №UA/11420/01/01 от 23.03.11. Пасконат (парааминосалициловая кислота, 3% раствор для инфузий). РС МОЗ Украины №UA/8132/01/01 от 15.03.2013. Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Перед применением следует обязательно ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препаратов ИЗОНИАЗИД®, ИНБУТОЛ®, РИФОНАТ®, ПАСКОНАТ® и общими предостережениями. Макет разработан: ООО «Би-Брайт Медиа». Фото: iStockphoto

ЮРІЯ·ФАРМ

www.uf.ua | www.tbc.in.ua

ООО «ЮРіЯ-ФАРМ»
Адрес: 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10
тел./факс: 044-275-01-08; 275-92-42