

# ЛЕФЛОЦИН 750

5 дней  
Кратчайший путь к цели

## ЛЕФЛОЦИН

Левифлоксацин является одним из наиболее безопасных антибактериальных препаратов, доступных сегодня

Короткие высокодозовые курсы левифлоксацина официально одобрены FDA

Многочисленными исследованиями доказаны клинические и фармакоэкономические преимущества левифлоксацина перед препаратами других групп в лечении инфекций различной этиологии и локализации



Информация о лекарственном препарате ЛЕФЛОЦИН®. Состав: 1 мл раствора содержит левифлоксацина (лево-энантиомера) 5 мг. Показания для применения. Левифлоцин® для внутривенного введения назначается при лечении бактериальных воспалительных процессов у взрослых, если они вызваны бактериями, чувствительными к левифлоксацину: воспалительные легочные, осложненные инфекции нижних отделов трахеи (в том числе пневмоцисты), инфекции кожи и мягких тканей, септицемия, бактериемия, интраабдоминальные инфекции. Способ применения и дозы. Левифлоцин® вводится внутривенно капельно, в зависимости от тяжести хода инфекции и чувствительности возбудителя. Веноинъекционная пневмония 500-1000 мг 1-2 раза/д, 7-14 дней. Инфекции мочевыводящего тракта 250 мг 1 раз/д, 7-10 дней. Инфекции кожи и мягких тканей 500-1000 мг 1-2 раза/д, 7-10 дней. Интраабдоминальные инфекции 500 мг 1 раз/д, 7-14 дней. Прямое действие. Со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе, понос. В некоторых случаях: отсутствие аппетита, рвота, боль в животе, расстройства пищеварения. Редко: кровавые поносы, которые иногда могут быть признаками воспаления кишечника, в том числе псевдомембранозного колита. Очень редко: снижение уровня сахара в крови (гипогликемия), которая имеет, возможно, особое значение для больных сахарным диабетом. Признаками гипогликемии могут быть повышенный аппетит, нервозность, потливость, дрожание конечностей. Относительно других химических веществ, что они, возможно, способны вызывать приступы порфирии у больных с наличием порфирии. Это может касаться также и Левифлоцина®. Со стороны печени и почек. Часто: повышение показателей печеночных трансаминаз (АЛТ, АСТ). В некоторых случаях: повышение показателей билирубина и креатинина в сыворотке крови. Очень редко: печеночные реакции, такие как воспаление печени. Ухудшение функции почек, вплоть до острой почечной недостаточности, например, в результате аллергических реакций (интерстициальный нефрит). Со стороны центральной нервной системы. В единичных случаях: головная боль, головокружение, сонливость, расстройства сна. Редко: непроизвольные спазмы, например, парестезия в кистях, дрожание, бессонница, состояние страха, суворонные припадки и покусывание языка. Очень редко: расстройства зрения и слуха, нарушение вкуса и обоняния, онемение ощущений на мышцах, усталость и истощение. Редко: поражение сухожилий, в том числе их разрывание, боли в суставах или мышцах. Очень редко: разрыв сухожилий (например, разрыв ахиллового сухожилия). Это побочное действие может проявиться в течение 48 часов от начала лечения и поразить активно функционирующие органы. Возможна вышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных туберкулезом легких. Единичные случаи: поражение мускулатуры (миогабитация). Действие на кровь. В некоторых случаях: повышение количества определенных клеток крови (лейкоцитоз), уменьшение количества лейкоцитов (лейкопения). Редко: снижение количества определенных лейкоцитов (нейтропения), уменьшение количества тромбоцитов (тромбоцитопения), которая может вызвать повышенную склонность к кровотечениям или кровоизлияниям. Очень редко: достаточно значительное уменьшение количества определенных лейкоцитов (агранулоцитоз), которое может привести к тяжелым симптомам болезни (длительная или рецидивирующая лихорадка, фарингит, выраженные болезненные самоощущения). Единичные случаи: снижение количества эритроцитов в результате их разрушения (гемолитическая анемия). Снижение числа всех видов клеток крови (панцитопения). Со стороны кожи и общие реакции повышенной чувствительности. В некоторых случаях: зуд и покраснение кожи. Редко: общие реакции повышенной чувствительности (анфилактоидные) с симптомами анафилактического шока (крапивница, отек Квинке, анафилактический шок). Другие побочные явления. Часто: боль и покраснение в месте введения в вену (веноинъекция). В некоторых случаях: общая слабость (истощение). Очень редко: аллергия, аллергические реакции со стороны легких (аллергический пневмонит) или небольших кровеносных сосудов (васкулит). Применение каких-либо антибактериальных средств может привести к нарушению, связанным с их влиянием на нормальную микрофлору человеческого организма. По этой причине может развиться вторичная инфекция, которая будет требовать дополнительного лечения. Протромбогенная. Повышенная чувствительность к хинолонам. Беспримечательность. Период кормления грудью. Дети в подростковом возрасте до 18 лет, беременные, женщины на поздних стадиях беременности после прекращения применения хинолонов, удлинении интервала QT. Условия отпуска. По рецепту. Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Перед применением следует обязательно ознакомиться с инструкцией для медицинского применения и общими предостережениями.

**ЮРИЯ-ФАРМ**

03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10  
тел./факс: 044-275-01-08; 275-92-42  
[www.uf.ua](http://www.uf.ua)

