# УЛЬТИБРО БРИЗХАЙЛЕР

## ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ГЛАВУ В ЛЕЧЕНИИ ХОЗЛ[2-6]

**Ультибро Бризхайлер, 1 раз в сутки, показан для поддерживающей бронходилятационной терапии для облегчения симптомов и снижения частоты обострений у взрослых пациентов с ХОЗЛ[1]**

**УЛЬТИБРО БРИЗХАЙЛЕР**

**Важное примечание:** перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата.

**Лекарственная форма:** порошок для ингаляций, твердые капсулы, содержащие 110 мкг индакатерола и 50 мкг гликопиррония.

**Показания:** поддерживающая бронхолитическая терапия для облегчения симптомов и снижения частоты обострений у взрослых пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ).

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к действующему веществу, к лактозе или к любому из вспомогательных веществ.

**Дозирование:** рекомендованная доза – ингаляция содержимого одной капсулы с помощью ингалятора Ультибро Бризхайлер один раз в сутки.

Особые группы пациентов: пациентам пожилого возраста, а так же пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек и печени, коррекция дозы не требуется. Пациентам с тяжелым нарушением функции почек или при терминальной стадии, требующей гемодиализа, Ультибро Бризхайлер следует применять только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Препарат не предназначен для применения у детей.

Предупреждения/меры предосторожности: не следует применять в качестве неотложной терапии. Как и при применении любой другой ингаляционной терапии, может возникнуть парадоксальный бронхоспазм. Следует применять с осторожностью у пациентов с закрытоугольной глаукомой и задержкой мочи. как и другие антихолинергические средства.

Беременность и кормление грудью: данные о применении препарата беременными женщинами отсутствуют. Неизвестно экскретируются ли в грудное молоко индакатерол, гликопирроний или их метаболиты.

**Взаимодействия:** совместное применение с другими анитхолинергическими препаратами не изучено, по этому не рекомендуется.

**Нежелательные явления:** очень часто (≥1/10) –инфекции верхних дыхательных путей, часто (≥1/100 до <1/10) - инфекции мочевыводящих путей, обморок, кашель, орофарингеальная боль, включая раздражение горла, диспепсия, кариес, скелетно-мышечная боль, гипертермия, боль в груди; нечасто (≥1/1000 до <1/100) – глаукома, сердцебиение, носовые кровотечения, обстукция мочевого пузыря и задержка мочи.

Регистрационное свидетельство №UA/14569/01/01 от 20.08.2015


1. Инструкция по медицинскому применению препарата Ультибро Бризхайлер, регистрационное свидетельство №UA/14569/01/01 от 20.08.2015;
2. Bateman ED, Ferguson GT, Barnes N, et al. Eur Respir J. 2013;42(6):1484-1494;
3. Wedzicha JA, Decramer M, Ficker JH, et al. lancet Respir Med. 2013;1:199-2094;
4. Volgelmeier CF, Bateman ED, Pallante J, et al. Lancet Respir Med. 2013;1:51-60;
5. Zhong N, Wang C, Zhou X, et al. [ERS abstract 700090]. Eur Respir J. 2014;43(suppl 58);
6. Buhl R, Gessner C, Schuermann W, et al. Thorax. 2015:70(4):311-319.



Информация для специалистов сферы охраны здоровья. Эта информация подлежит передаче лично зарегистрированным/идентифицированным специалистам сферы охраны здоровья в рамках специализированных семинаров, конгрессов/или симпозиумов по медицинской тематике. Распространение данной информации какими-либо способами, оторые дают доступ к ней к неопределенному кругу лиц, запрещено.

**ультібро**
**бризхайлер**

NOVARTIS PHARMACEUTICALS


Новартис Фарма Сервисез АГ Представительство в Украине
Украина, 02098, г. Киев, ул. Березняковская, 29
Тел.: +380 44 3893930, факс: +380 44 3893933