



2

АКТИВНИХ КОМПОНЕНТИ β2-агоніст + М-холіноблокатор РІВНІ ПОЛЕГШЕННЯ дрібні і великі бронхи



Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу БЕРОДУАЛ® Н

СКЛАД: Дієч речовини: інтратропію бромід, фенотеропу гідробромід. 1 доза містить інтратропію бромід 21 мг, що еквівалентно інтратропію броміду безоцорного 20 мг; фенотеропу гідроброміду 50 мг. Допоміжні речовини: пропелент: 1,1,1,2-тетрафторетан (HFA 134a), кислота лимонна безводна, вода очищена, етанол безводний.

ЛІКАРСЬКА ФОРМА: Аерозоль дозуваний.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА: Препарати для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Адренергічні засоби у комбінації з антихолінергічними засобами, Фенотероп та інтратропію броміду. Код ATХ: J03AX02.

ПОКАЗАННЯ: Профілактика та симптоматичне лікування хронічних обструктивних порушень проходимості дихальних шляхів: астма, алергічна та неалергічна (ендогенна) бронхіальна астма, астма, спричинена фізичним навантаженням, та хронічний обструктивний бронхіт з емфіземою або без емфіземи; підготовка до «відкриття легень» та підтримка аерозольної терапії кортикоステоидами, муколітиками, сальвіаторами, кромолігнікою кислотою та антибіотиками; При діагностичній терапії недобре призначення симулюючими препаратами.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: Підвищена чутливість до фенотеропу гідроброміду або до атропіногірских речовин чи будь-яких допоміжних речовин цього препарата. Гіперрефлексична обструктивна кардіоміопатія та тахаритіс.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ: Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від природи та тяжості захворювання.*

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Під час застосування БЕРОДУАЛ Н, як і всіх лікарських засобів, можуть виникати побічні реакції. Як і при іншій інгаляційній терапії, БЕРОДУАЛ Н може спричинити симптоми місцевого подразнення. Найчастішими побічними ефектами, виявленими під час клінічних досліджень, були кашель, відсутність

сухоти у роті, головний біль, трімор, фарингіт, нудота, запаморочення, діарея, тахикардія, прискорене сердцебиття, блісцання, підвищення систолічного артеріального тиску та нервозність.*

ДІЇ: Застосуванням інтратропу броміду 21 мг, що призначено для інгаляції, відбувається відновлення вентиляції бронхів від засмоктуванням та нападом дорошин.

ФАРМАКОДІНАМІКА: При інгаляціонному застосуванні дієч речовини фенотероп відкриває бронхи відбувається зниженням резистенції дихальних фармакологічних механізмів. Також, ці активні речовини чинять комбіновану спазмолітичну дію на бронхіальні м'язи, що дає змогу широко застосовувати їх при захворюваннях бронхолегеневого апарату, пов'язаних з порушенням проходимості дихальних шляхів, а також, для відкриття легень та підтримки дихання під час зменшення кількості побічних ефектів.*

ЛІКАРСЬКА ФОРМА: Розчин для інгаляції.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА: Препарати для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами. Код ATХ: R03A-L01.

КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ: За рецептом.

ВИРОБНИК: Бернгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина. Р.П. в Україні: UA/5322/01/01.

* Комбінований лікарський засіб у різних лікарських формах та дозуваннях. Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, а також для розповсюдження для спеціалістів у галузі охорони здоров'я, та інших наукових заходах з медичної тематики.

** Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату БЕРОДУАЛ Н.

Представництво: «Бернгер Інгельхайм РІВІМХ енд КоКГ в Україні»: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 28А. З поверх, тел.: (044) 494-12-75.

Питання стосовно Медичної інформації: будь ласка, надсилайте на електронну адресу:

MEDICALInformation.KB@boehringer-ingelheim.com

Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу БЕРОДУАЛ®

СКЛАД: Дієч речовини: інтратропію броміду, фенотеропу гідробромід: 1 мл, що еквівалентно 2 мг інтратропію броміду безводного; фенотеропу гідроброміду 500 мг. Допоміжні речовини: бензалкононгіхол, дінтартою едетат, нафро уксід, кислота хлористоводнева концентрована, вода очищена.

ДІЇ: БЕРОДУАЛ застосовується у педіатричний практиц. Для лікування дієч речовини та інтратропію броміду за умови медичного нагляду за стечом пацієнта.

ФАРМАКОДІНАМІКА: При одночасному застосуванні двох активних бронходілататорів розширення бронхів відбувається шляхом реагування двох різних фармакологічних механізмів. Таким чином, дві активні речовини чинять комбіновану спазмолітичну дію на бронхіальні м'язи, що дає змогу широко застосовувати їх при захворюваннях бронхолегеневого апарату, пов'язаних з порушенням проходимості дихальних шляхів. Для ефективної комбінованої дії потребує дуже невелика кількість дозування, пов'язаного з порушенням проходимості дихальних шляхів.

Для ефективної комбінованої дії потребує дуже невелика кількість дозування, пов'язаного з порушенням проходимості дихальних шляхів.

ПОКАЗАННЯ: Підвищена чутливість до фенотеропу гідроброміду, атропіногірські речовини чи до інших компонентів препарату, гіперрефлексична обструктивна кардіоміопатія, тахаритіс.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ: Тільки для інгаляції за допомогою небулізатора. Післяважаємо, що під час застосування БЕРОДУАЛ Н, як і інші лікарські засоби, можуть виникати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ДІЇ: БУДЬ ЛАСКА, ВІДСУЩУЙ СУХОТУ У РОТІ, ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, ТРІМОР,

ФАРІНГІТ, НУДОТА, ЗАПАМОРОЧЕННЯ, ДІАРЕЯ, ТАХІКАРДІЯ, ПРИСКОРЕНОЕ СЕРДЕЧНОБІЛОСТЬ, БЛОІВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ СИСТОЛІЧНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА НЕРВОЗНІСТЬ.*

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: Як і інші лікарські засоби інгаляційної терапії, БЕРОДУАЛ може викликати симптоми місцевого подразнення, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тем