

Ереспал®

Фенспірид

НОВИЙ ІМІДЖ ДОВЕДЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ І ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

ОНОВЛЕНИЙ
СКЛАД



Дихальних шляхів
ЛОР-органів
ХОЗЛ**

Склад: 1 таблетка містить 80 мг фенспіриду гідрохлориду, 100 мг сиропу містить 200 мг фенспіриду гідрохлориду. **Фармако-терапевтична група*** Засоби, що діють на респіраторну систему. Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях респіраторної системи. Код АТХ R03D X03. **Фармакологічні властивості*** Ереспал® має антибронхоконстрикторні та протезальні властивості, зумовлені взаємодією кількох генів різних механізмів: блокування Н1-гістамінових рецепторів та спазмолітична дія на гладку мускулатуру бронхів; протизапальна дія, яка є результатом зменшення продукції прозапальних факторів (цитокинів, TNF- α , прозапальних цитокинів, про-тапалінів, лейкотрієнів, тромбоксану, вільних радикалів); діє як тазовичачий бронхожонкторний діє; блокування α_1 -адренорецепторів, які стимулюють секрецію в'язкого слизу. **Показання*** Лікування гострих і хронічних запальних процесів ЛОР-органів та дихальних шляхів (гості, синусит, риніт, ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ)**, у складі комплексної терапії бронхіальної астми. Складний та цілісний аеролізний риніт та інші прояви алергії з боку респіраторної системи та ЛОР-органів. Респіраторні прояви кори, грипу. Симптоматичне лікування коклюшу. **Протипоказання*** Підвищена чутливість (алергія) до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату. Дітячий вік до 2 років. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій*** Одночасне застосування фенспіриду та седативних препаратів або вживання алкоголю не рекомендується. **Особливості застосування*** Таблетки. Лікування препаратом не замінює антибіотикотерапії. Сироп. До складу препарату входить сахароза, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози, сахарозо-ізомаляктозною недостатністю не рекомендується приймати цей препарат. Пацієнтам із цукровим діабетом при застосуванні препарату Ереспал® сироп, необхідно враховувати наступну інформацію: 1 чайна ложка препарату (3 мл) містить 3 г сахарози, відносно одна столова ложка (15 мл сиропу) містить 9 г сахарози. Через наявність у складі препарату парабенів (метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат) цей лікарський засіб може викликати алергічні реакції (можливо відстрочені). **Застосування у період вагітності або годування груддю*** Дані щодо застосування фенспіриду під час вагітності обмежені. Тому застосовувати препарат у період вагітності не рекомендується, проте дані стосовно вагітності під час лікування фенспіридом не є підставою для переривання вагітності. У дослідженнях на тваринах спостерігалися випадки виникнення вогнищ у шкурі та щирі та корки. Невідомо, чи проникає фенспірид у грудне молоко. Тому Ереспал® не слід застосовувати після народження дитини. **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами*** Особливий препарат може викликати сонливість, то він має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, особливо на початку лікування або працювати з іншими механізмами у разі одночасного вживання алкоголю. **Спосіб застосування та дози*** Таблетки. Ереспал® у формі таблеток рекомендується застосовувати дорослим. Для перорального застосування. Застосовувати перед їм. Звичайна рекомендована терапевтична доза для лікування хронічних запальних процесів становить 2 таблетки на добу (вранці) та ввечері. Для посилення ефекту (добу) у разі гострих захворювань рекомендується застосовувати 3 таблетки на добу (по 1 таблетці вранці, адень ввечері). Сироп. Добову дозу слід розподіляти на 2-3 прийоми та приймати перед їм. Рекомендується добуву дозу слід призначати з урахуванням маси тіла та віку, але вона не повинна перевищувати добуву дозу (див. нижченаведену інформацію). Застосування дітям від 2 років. Рекомендується добува доза становить 4 мг/кг маси тіла (2 мл/кг маси тіла). Дітям віком від 2 років з масою тіла менше 10 кг, відносна доза становить від 2 до 4 чайних ложок сиропу (10-20 мл), відповідно 20-40 мг фенспіриду гідрохлориду на добу. Дітям віком від 2 років з масою тіла понад 10 кг до 12 років; добува доза становить від 2 до 4 столових ложок сиропу (30-60 мл), відповідно 60-120 мг фенспіриду гідрохлориду на добу. Застосування дорослим та дітям віком від 12 років. Добова доза сиропу становить від 3 до 6 столових ложок (45-90 мл), відповідно 90-180 мг фенспіриду гідрохлориду на добу. **Передозування*** Побічні реакції* Часті: Різкодія травлення, нудота, біль у шлунку. Рідкі: Сонливість, еритема, висипання, кров'яні янкі, ангіоедема, фіксована еритема. **Частота невідомо:** Запаморочення, помірні тажкардія, віротно пов'язана з тажкардією; артеріальна гіптензія, віротно пов'язана з тажкардією; дарср, білоковані свердлові, токсичний ендермальний некроліз, синдром Стивенса-Джонсона, астенія (слабкість), втомля. **Упаковка*** По 15 таблеток у блистері (ПВУ/алюміній); по 2 блистеру у коробці з картону. По 150 мл сиропу у флаконі. По 1 флакону у коробці з картону. **Категорія відпуску:** За рецептом. **Виробник:** Лібораторії Сер'єв'є Індрстрі, Франція/Les Laboratoires Servier Industrie, France. **Регістраційні посвідчення:** таблетки П/УА/3703/02/01 Навка МОЗ України 04.09.2015 № 578; сироп П/УА/3703/01/01 Навка МОЗ України 19.08.16 № 527.

* Детальна інформація вказана в інструкції для медичного застосування препарату Ереспал®, таблетки та Ереспал®, сироп.

** Для препарату Ереспал®, таблетки

Для препарату Ереспал®, сироп

Інформація призначена для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Для додаткової інформації відвідайте сайт: www.servier.ua

Представництво «Ле Лаборатору Сер'єв» в Україні:
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24.
Тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 494-14-96.

Імпортер: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сер'єв Україна»:
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24.
Тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 494-14-96.

