

Ю. М. Валецький, Р. О. Валецька

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПОЗАЛЕГЕНЕВОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Волинське обласне територіальне медичне протитуберкульозне об'єднання
Волинська обласна клінічна лікарня*

Вступ

Аналізуючи ситуацію що склалася можна вважати, що немає передумов для оптимізму щодо подолання епідемії туберкульозу ближчим часом. Це обумовлено, в першу чергу, зростанням частоти мультирезистентних форм туберкульозу та ко-інфекції СНІД/туберкульоз.

На тлі контролю за ситуацією щодо легеневого туберкульозу в Україні актуальною проблемою залишається питання діагностики позалегенового туберкульозу. За даними літератури, у структурі захворюваності на нього в Україні позалегеновий туберкульоз органів дихання становить 58,0 %. Друге місце посідає кістково-суглобовий туберкульоз, потім туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів, сечостатевої системи, очей, нервової системи та інших локалізацій. У комплексній діагностиці позалегенового туберкульозу актуальні сучасні променеві методи, контактні й неінвазивні дослідження, бактеріологічні, генетичні, імунологічні, біохімічні тощо. Складна епідемічна ситуація з туберкульозу в країні висуває на передній план потребу у використанні швидких методів діагностики, зокрема полімеразної ланцюгової реакції та пошук інших методів та методик.

Мета роботи — вивчити частоту різної локалізації туберкульозу у Волинській області у хворих які були діагностовані в 2016 році.

Матеріали та методи

Проведено аналіз статистичних даних та медичної документації хворих на вперше діагностований туберкульоз у Волинській області в 2016 році.

Результати та обговорення

Протягом 2016 року на всі форми активного туберкульозу у Волинській області захворіло 620 осіб (100 %), що становить 59,62 на 100 тис. населення. Легенева локалізація мала місце у 527 (85,0 %) випадках, а позалегенева — у 93 (15,0 %). Порівняно з 2015 роком (131 випадок), у 2016 році кількість випадків виявлення позалегенових локалізацій зменшилась на 30,01 %.

По локалізації виявленого туберкульозу в 2016 році картина виглядає наступною: плевра — 58 (62,36 %) випадків, кістки та суглоби — 18 (19,35 %), очі — 11 (11,82 %), кишківник — 3 (3,23 %), центральна нервова система — 2 (2,15 %), периферичні лімфатичні вузли — 1 (1,07 %).

Висновки

1. Частота позалегенових форм туберкульозу у Волинській області в 2016 році становила 15,0 %.

2. У Волинській області в 2016 році виявлено на 30,01 % туберкульозу позалегенової локалізації менше ніж у 2015 році.

3. Припускаємо, що має місце гіподіагностика позалегенових форм туберкульозу у Волинській області, особливо з локалізацією в сечовидільній системі.

4. Припускаємо, що причиною ймовірної гіподіагностики позалегенових локалізацій туберкульозу є низька настороженість лікарів різних спеціальностей до позалегенової локалізації туберкульозу та недосконалість методів його діагностики та верифікації.