

Л. А. Масюк, О. П. Недоспасова

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КО-ІНФЕКЦІЇ ТБ/ВІЛ В УКРАЇНІ

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»
ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»

Медичною проблемою сучасності в Європейському регіоні ВОЗ залишається епідемічна ситуація з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ. Впродовж 2007–2014 років частка випадків поєднаної патології ТБ/ВІЛ збільшилася з 2,8 до 8,0 % при середньому річному прирості в 13,0 %.

Мета — визначення тенденцій щодо захворюваності та смертності ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні впродовж 2006–2016 років.

Методи дослідження

Аналіз статистичних даних форм звітності № 8 «Звіт про захворювання на активний туберкульоз», № 33-здоров «Звіт про хворих на туберкульоз» 2006–2016 років.

Результати дослідження

Впродовж останніх 10 років констатовано зниження захворюваності на туберкульоз (2006 р. — 95,6, 2016 р.

— 67,6 на 100 тис. нас.), але захворюваність на туберкульоз у поєднанні зі СНІДом має стійку тенденцію до зростання (2006 р. — 4,8, 2016 р. — 13,2 на 100 тис. нас.).

Найвищі показники захворюваності на ТБ/ВІЛ зареєстровані у 2016 році у Одеській (47,9 на 100 тис. нас.), Дніпропетровській та Київській (24,4 на 100 тис. нас.) областях, найнижчі — у Закарпатській (2,2 на 100 тис. нас.) та Чернівецькій (2,3 на 100 тис. нас.) областях.

На фоні достовірного зниження у двічі показника смертності від ТБ в Україні (за даними ЗОЗ системи МОЗ України) впродовж останніх 10 років (2006 р. — 21,6 на 100 тис. нас., 2016 р. — 9,3), рівень смертності від хвороби, зумовленої СНІДом у хворих на ТБ має тенденцію до зниження з 2012 року і в 2016 році становить 4,2 на 100 тис. населення (2012 рік — 6,1 на 100 тис. нас.).




Рис. 1. Динаміка захворюваності та смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ, Україна, 2006–2016 рр.

Найвищі показники смертності від хвороби, зумовленої СНІДом у хворих на ТБ зареєстровані у 2016 році у Дніпропетровській (14,1 на 100 тис. нас.), Одеській (11,6 на 100 тис. нас.), Миколаївській (9,9 на 100 тис. нас.) областях, найнижчі — у Закарпатській (0,3 на 100 тис. нас.), Чернівецькій (0,4 на 100 тис. нас.) та Сумській (1,0 на 100 тис. нас.) областях.

Висновок

Захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ впродовж останніх 10 років має тенденцію до зростання, з 2006 року даний показник захворюваності зріс майже в 3 рази; смертність від хвороби, зумовленої СНІДом у хворих на ТБ з 2012 року має тенденцію до щорічного зниження в середньому на 7,0 %.