

Висновки

Таким чином, визначення особливостей розподілу клініко-нозологічних ознак вказує на те, що мають місце суттєві відмінності клініко-нозологічних характеристик поєднаної травми, а також доводить існу-

вання статистично достовірного зв'язку між нозологічними одиницями, які є складовими поєднаної травми, що дозволить в подальшому для подальшої верифікації явища визначити їх як ризик-створюючі фактори.

ЛІТЕРАТУРА

1. Колкин Я.Г., Першин Е.С., Колкина В.Я. Тяжёлые травматические повреждения костного каркаса грудной клетки // Проблемы військової охорони здоров'я. — Випуск II. — Київ, 2002. — С. 314-319.
 2. Флорикян А.К. Хирургия повреждения груди (патофизиология, клиника, диагностика, лечение): Избранные лекции. — Харьков: «Основа», 1998. — 504 с.
 3. Oregory P., Sanders K. Management of the polytrauma patient! // Clin.Orthopaed. Relat. Res. — 1995. — Vol.318. — P. 2-3.
 4. Naas N.P., Hoffmann R.F.G., Mauch C. et al. The management of polytraumatized in Germany // Ibid. — P. 25-35.
 5. Meyer DM: Hemothorax related to trauma. Thorac Surg Clin 2007, 17:47-55
-