



*Довіра до препаратів KRKA — це довіра  
до європейських інновацій і високої якості*

## Примусимо їх здатися!



**Склад:** Таблетки, покриті плівковою оболонкою: діюча речовина: левофлоксацин; 1 таблетка містить левофлоксацину 500 мг у вигляді левофлоксацину гемігідрату. Розчин для інфузій: 1 мл розчину містить 5 мг левофлоксацину у вигляді левофлоксацину гемігідрату. **Фармакотерапевтична група.** Антібактеріальні засоби для системного застосування. Фторхінопони. Левофлоксацин. **Фармакологічні властивості.** **Фармакодинаміка.** Левофлоксацин – це синтетичний антибактеріальний препарат із групи фторхінопонів. Механізм дії. Левофлоксацин, як антибактеріальний препарат з групи фторхінопонів, діє на комплекс ДНК-гірази та топотіазеразу IV. **Показання.** Інфекції, спричинені чутливими до препарату мікроорганізмами: гострій бактеріальний синусит; загострена хронічна бронхіт; негострільні пневмонії; ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканей (для лікування вищепоказаних інфекцій препарат Леваксела® слід застосовувати тільки тоді, коли вважається недоцільним використання антибактеріальних засобів, які зазвичай рекомендують для початкового лікування цих інфекцій); ускладнені (зокрема піллонефрити) та неускладнені (зокрема цистит) інфекції сечовивідних шляхів; хронічний бактеріальний простатит; легенева форма сибірської виразки; профілактика після контактів і лікування. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до левофлоксацину, інших фторхінопонів або будь-яких інгредієнтів препарату; епілепсія; поширення сухожилів; пов'язані з застосуванням фторхінопонів; дітям від 12 років та підліткам; період годування тварин. **Способ застосування та дози.** Препарат приймати 1 або 2 рази і на добу. Доза залежить від типу і тяжкості інфекції. Тривалість лікування залежить від перебігу хвороби. **Дії.** Левофлоксацин протипоказаний дітям (віком до 18 років), осільки не виключено пошкодження суглобового хряща. **Побічні реакції.** Інфекції та інвазії; нечасто: грибкові інфекції, включночі інфекції спричинені грибками роду *Candida*. З боку кровоносної та лімфатичної систем; з боку імунної системи; порушення обміну речовин і харчування; з боку психіки; з боку нервової системи; з боку органів зору; з боку органів слуху; з боку серцево-судинної системи: судинні розлади (arterialna гіпотензія); з боку дихальної системи; органів грудної клітки та середостіння: задишка, бронхоспазм, алергічний пневмоніт; з боку травної системи: діарея, нудота, блівлення, біль у животі, диспесія, метеоризм, запор; з боку печінки і ховковивідних шляхів: підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ/АСТ, лужна фосфатаза, ГГТ); з боку шкіри та підшкірних тканин: висип, свербіж, крапив'янка, гіперідроз; з боку скелетно-н'язової системи та сполучної тканини; з боку сечовидільнної системи: підвищення рівня креатиніну в крові; загальні розлади: астенія, ліхоманка. Аналіфактичні та аналіфактоїдні реакції можуть іноді виникати після введення першої дози препарату. Реакції слизових оболонок можуть іноді виникати після введення першої дози препарату. До інших побічних ефектів, пов'язаних із застосуванням фторхінопонів, належать приступи порфірії у хворих на порфірію. **Категорія відпуску.** За рецептром.

Повна інформація про лікарський засіб вказана в інструкції для медичного застосування. Розповсюджується на семінарах, конференціях і симпозіумах з медичної тематики

2018-032945

ТОВ "KRKA УКРАЇНА", 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13, секція В-Г, офіс 127, а/с 42

тел.: (044) 354 26 68, факс: (044) 354 26 67, e-mail: Info.ua@krka.biz, веб-сайт: www.krka.ua

Посилання: 1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Леваксела. 2. Noel GJ. A Review of levofloxacin for the treatment of bacterial infections. Clinical Medicine: Therapeutics 2009;1: 433–58.



*Наши знання та прагнення присвячені здоров'ю. Рішучість, наполегливість та майстерність в поєданні з єдиною метою – створення ефективних та безпечних препаратів найвищої якості.*

## ЛЕВАКСЕЛА®

Таблетки покриті плівковою оболонкою, 500 mg  
леофлоксацін  
Розчин для інфузії, 5 mg / мл

**Леваксела – європейський  
леофлоксацін в Україні<sup>1</sup>**

**Надійна активність  
проти широкого спектру  
збудників<sup>2</sup>**

**Можливість ступеневої  
терапії<sup>1</sup>**

**Повна перемога  
над бактеріями  
з Левакселою<sup>1,2</sup>**