


Амоксиклав® Квіктаб

амоксицилін + клавуланова кислота

ДИСПЕРГОВАНІ ТАБЛЕТКИ З БІОДОСТУПНІСТЮ 96,5%, СПІВВІДНОСНОЮ З ІН`ЕКЦІЙНОЮ ФОРМОЮ!^{6,7}


Таблетки, що диспергуються⁵



Біодоступність 96,5%⁷




Ризик виникнення діареї⁹




Таблетки вкриті плівковою оболонкою



Біодоступність 70%⁸



Ризик виникнення діареї⁹



- **Препарат першого вибору у лікуванні інфекцій нижніх та верхніх дихальних шляхів¹⁻⁴**

- **Амоксиклав® Квіктаб 500 мг/125мг дозволений до застосування у дорослих та дітей від 6 років (від 25 кг)⁵**



1. Наказ МОЗ України № 181 від 21.04.2015р., «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Дитяча отоларингологія». 2. Наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016., «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ототоларингологія». 3. Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Дитяча пульмонологія». 4. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія». 5. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу. 6. Kristi M. Kuper, Intravenous to Oral Therapy Conversion, 2008. 7. HU Guoxin, Journal of Huazhong University of Science and Technology, 22 (3): 224-227, 2002. 8. Amoxicillin with clavulanic acid, Summary of product characteristics, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Augmentin_30/WC500090608.pdf. 9. Гучев І.О., Козлов Р.С. Безпечність і ефективність різних лікарських форм амоксициліну клавуланової кислоти при ІНДШ у дорослих: відкрите проспективне рандомізоване дослідження, Пульмонологія 2,2008.

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ

Діючі речовини: 1 таблетка містить 500 мг амоксициліну у формі амоксициліну тригідрату та 125 мг кислоти клавуланової у формі калієвої солі або 1 таблетка містить 875 мг амоксициліну у формі амоксициліну тригідрату та 125 мг кислоти клавуланової у формі калієвої солі. Лікарська форма. Таблетки, що диспергуються. Фармакотерапевтична група. Код АТХ J01C R02

Показання. Лікування бактеріальних інфекцій, спричинених чутливими до комбінації амоксицилін/кислота клавуланова мікроорганізмами: гострий бактеріальний синусит; гострий середній отит; підтвержене загострення хронічного бронхіту; негоспітальна пневмонія; цистити; пієлонефрити; інфекції шкіри та м'яких тканин, у т.ч. целюліти, укуси тварин, тяжкі дентоальвеолярні абсцеси з поширеним целюлітом; інфекції кісток та суглобів, у т.ч. остеомиєліти. Спосіб застосування та дози. Препарат слід застосовувати згідно з офіційними рекомендаціями щодо антибіотикотерапії та даними місцевої чутливості до антибіотика. Діти. Амоксиклав® Квіктаб 500 мг / 125 мг: віком від 6 років з масою тіла від 25 до 40 кг. Амоксиклав® Квіктаб 875 мг/ 125 мг для дітей від 12 років з масою тіла від 40 кг. Категорія відпуску. За рецептом. Препарат має протипоказання та може викликати побічні реакції, в тому числі серйозні. Для більш детальної інформації дивись повну інструкцію для медичного застосування лікарського засобу.

РП № UA/3011/04/02, UA/3011/04/01

SANDOZ A Novartis Division

Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров'я.

Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту: +380 (44) 389 39 30, drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua 1-02-АМВ-АІГ-0118