

Ю. П. Цапенко

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО І З РОЗШИРЕНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДОРΟΣЛИХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

У роботі проаналізована епідемічна ситуація щодо мультирезистентного

туберкульозу у Полтавській області за останні 2 роки (2015–2016 рр.) на підставі ретроспективного аналізу щорічних звітів протитуберкульозних медичних закладів Полтавської області.

Результати та обговорення

Наші дослідження показали, що за період 2015–2016 рр. у Полтавській області спостерігалось зменшення захворюваності на мультирезистентний туберкульоз (МР ТБ) в 1,3 рази (з 283 до 221 випадків). Але в структурі МР ТБ зросла частка туберкульозу з розширеною резистентністю (РР ТБ), з 32,5% у 2015 р. до 36,7% у 2016 р. (відповідно у 2015 р. з 283 випадків (вип.) МР ТБ – 92 з РР ТБ, тоді як з 221 МР ТБ – 81 вип. РР ТБ у 2016 р.).

Аналогічна ситуація зростання у структурі МР ТБ серед нових випадків, де частка МР ТБ зросла з 37,1% у 2015 р. до 49,3% у 2016 р. (відповідно 105 МР ТБ вип. у 2015 р. та 109 МР ТБ у 2016 р.). При аналізі МР ТБ серед нових випадків, відмічено зростання РР ТБ, якщо у 2015 р. серед 105 нових вип. МР ТБ з РР ТБ було 18 вип. (17,1%), то у 2016 р. цей показник зріс і становив 22 вип. РР ТБ серед 109 нових вип. МР ТБ (20,2 %).

Таким чином, за останні роки (2015–2016 рр.) у Полтавській області на тлі зменшення захворюваності на МР ТБ, зросла частка туберкульозу з розширеною резистентністю (з 32,5% у 2015 р. до 36,7% у 2016 р.) та зросли показники МР ТБ та РР ТБ серед нових випадків, відповідно з 37,1% у 2015 р. до 49,3% у 2016 та з 17,1% у 2015 р. до 20,2 % у 2016 р..