

Д. М. Бойко, С. Г. Гордієнко, О. С. Бойко
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ САРКОЇДОЗУ В РЕГІОНІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Суми*

Проблема саркоїдозу є достатньо відомою, проте остаточної крапки у її етіопатогенезі ще не поставлено. Обмежена кількість публікацій, присвячених епідеміології саркоїдозу в Україні, дає нам підстави для наукових пошуків у цьому напрямку.

Мета — вивчити регіональні особливості епідеміології саркоїдозу в Полтавській області.

Матеріали та методи

Проаналізовано наявні дані про хворих на саркоїдоз у регіоні Полтавської області за останні 10 років та особливості розподілу за гендерними ознаками, місцем проживання (у місті чи сільській місцевості) та діагнозом.

Результати

Всього було ідентифіковано 163 хворих на саркоїдоз у

Полтавській області. Переважна більшість пацієнтів проживає у містах (69 %), де й сконцентрована основна кількість населення. Серед пацієнтів із саркоїдозом переважали жінки (63 %), а середній вік був у межах ($53,8 \pm 12,7$) років. Основну когорту серед хворих на саркоїдоз склали пацієнти з саркоїдозом легень та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Гострий перебіг (синдром Lofgren) зустрічався у 8,5 %.

Висновки

Превалювання жіночої статі, комбінація ушкоджень легень та внутрішньогрудної лімфаденопатії стали превалюючими особливостями перебігу саркоїдозу в Полтавській області. Частка хворих на саркоїдоз у регіоні склала 0,01 % від загальної кількості наявного населення.