

МУКОЛІТИК
Інгаміст



ЕТІОТРОПНОЇ
ТЕРАПІЇ СИНЕРГІСТ!

Інгаміст®
Ацетилцистеїн для
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО та ІНГАЛЯЦІЙНОГО
введення¹

НОЗОКОМІАЛЬНА
ПНЕВМОНІЯ

ГІПОСТАТИЧНА
ПНЕВМОНІЯ

ГОСТРИЙ
БРОНХІТ

БА** У СТАДІЇ
ЗАГОСТРЕННЯ

ХОЗЛ*
З ГОСТРОЮ
ІНФЕКЦІЄЮ

НЕГОСПІТАЛЬНА
ПНЕВМОНІЯ



ІНГАМІСТ® (ацетилцистеїн) - муколітичний препарат¹

Показання: гострі та хронічні захворювання органів дихання, що супроводжуються утворенням мокротиння з підвищеною в'язкістю.

Протипоказання: підвищення чутливості до ацетилцистеїну або до інших компонентів препарату, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення, легеневе кровохаркання.

Побічні реакції при місцевому застосуванні: реакції гіперчутливості, бронхоспазм, ринорея, стоматит, кропив'янка, висип, свербіж.

При парентеральному застосуванні: анафілактичний шок, анафілактичні реакції, тахікардія, зниження артеріального тиску, бронхоспазм, диспное, нудота, диспепсія.

Особливі застереження: Пацієнтам з бронхіальною астмою в період терапії Інгаміст® необхідно знаходитися під наглядом лікаря. Розчин Інгаміст® не повинен контактувати з гумовими та металевими поверхнями.

* хронічне обструктивне захворювання легень

** бронхіальна астма

Даний матеріал призначений лише для медичних спеціалістів та для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів. ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» не рекомендує застосування ІНГАМІСТ® з цілями, які відрізняються від тих, що прописані в інструкції. Перед призначенням ІНГАМІСТ®, будь ласка, ознайомтесь з повним текстом інструкції виробника по застосуванню препарату.
Р/с UA/14062/01/01 1. Інструкція по медичному застосуванню до препарату ІНГАМІСТ®

ЮРІЯ-ФАРМ

03680 м. Київ, вул. Амосова, 10
тел./факс: (044) 275 - 01-08, 275-92-42
www.uf.ua