

Л. А. Гришук, Л. І. Медвідь, Н. С. Майовецька, Р. Л. Кізан, М. В. Панькевич
ЧАСТОТА І ХАРАКТЕР ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЗА ДАНИМИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ

*ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер*

Проблема хіміорезистентного туберкульозу в Україні надзвичайно актуальна, кількість хворих з первинною та набутою резистентністю постійно зростає. Наявність хіміорезистентності до протитуберкульозних препаратів значно знижує ефективність лікування хворих на туберкульоз, продовжує терміни, а також підвищує економічні витрати на лікування.

Метою роботи було вивчити частоту і характер медикаментозної резистентності МБТ хворих на туберкульоз легень у 2015-2017 роках за даними Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Проведено аналіз 351 стаціонарної історії хвороби пацієнтів на хіміорезистентний туберкульоз легень з бактеріовиділенням.

За статтю переважали чоловіки — 285 (81,2 %). Вікові групи до 41 року склали 149 (42,4 %) і від 41 до 60 років — 167 (47,6 %) осіб. За типами туберкульозного процесу хворі розподілись таким чином: вперше діагностований туберкульоз легень був у 162 (46,1 %), рецидив туберкульозного процесу — у 136 (38,5 %) пацієнтів, лікувались неефективно або лікувались після перерви — 54 (15,4 %). З клінічних форм туберкульозу легень переважно спостерігались інфільтративна у 214 (60,9 %) та дисемінована у 105 (29,9 %). Серед видів резистентності переважали хворі на мультирезистентний туберкульоз легень, який діагностований у 210 (59,8 %) пацієнтів.

Таким чином встановлено, що хіміорезистентний туберкульоз легень переважно діагностується у чоловіків (81,2 %), осіб працездатного віку (90,0 %), переважає мультирезистентна форма (59,8 %).

© Гришук Л. А., Медвідь Л. І., Майовецька Н. С., Кізан Р. Л.,
Панькевич М. В., 2019