

**О. В. Сейковський, М. М. Багіров, М. Н. Гурмак, М. В. Лукасевич,
Б. Н. Гвоздєв**
**ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ
ПЛЕВРОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

Киевская городская клиническая больница № 17

С 2002 по 2017 г. под наблюдением находилось 1320 больных в возрасте от 16 до 80 лет. Мужчин было 1088 женщин 232. Подавляющее большинство пациентов были трудоспособного возраста (74 %). Эмпиема плевры явилась осложнением тяжелой плевропневмонии (56 %), деструкции легких (31,3 %) и других соматических заболеваний (7,8 %). Острая эмпиема составила 77 %, хроническая 23 %. В 16,8 % случаях состояние больных было критическим (двусторонняя деструкция, гангрена, медиастинит, сепсис, политравма, сопутствующие болезни). Тотальная эмпиема составила 41,9 %,

ограниченная — 49,4 %. У 31,1 % течение болезни осложнилось бронхоплевральным свищем. У 97,1 % больных применена миниинвазивная хирургия. Пациентам с хроническими заболеваниями применены различные варианты операций (3 %).

Комплексным лечением достигнуто выздоровление у 79,6 % пациентов, у 11 % достигнуто улучшение с ликвидацией гнойных осложнений.

Умерло 44 больных (3,3 %), леченных по поводу гангрены (4), двусторонней деструкцией (12), на фоне сепсиса (1) или рака (5). Причиной летального исхода явились: ТЭЛА (20), полиорганная недостаточность (16), другие причины (8).

© Сейковський О. В., Багіров М. М., Гурмак М. Н., Лукасевич М. В.,
Гвоздєв Б. Н., 2019