

# ДЕРКАСТ®

ЕДИНИЙ ПАРЕНТЕРАЛЬНИЙ

Обґрунтований контроль  
бронхоспазму та запалення  
на госпітальному етапі

## ПРОДУКТ РОЗРОБЛЕНІЙ

спеціально для пацієнтів із загостреним  
бронхіальної астми та ХОЗЛ\*



### КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРЕПАРАТУ ДЕРКАСТ®

**Склад.** Діючі речовини: 1 мл теофіліну моногідрату (у перерахунку на теофілін) 2 мг, калію хлориду 0,3 мг, магнію хлориду гексагідрату (у перерахунку на магній) 0,2 мг, калію ціаніду моногідрату (у перерахунку на теофілін) - 2,0 мг. Магній ціанід (у перерахунку на магній) 0,3 мг. Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, кислоти, кади для ін'єкцій. Засіб у вигляді суспензії для дітей місцевого застосування при температурі не вище 25°C. Не заморожувати. Відпускається за рецептом.

**Діяльність.** Стимулює дихальну мішку, зменшує рефлектичний алергічний рефлюкс судин, набряк легенів, геморагічний інсульт, крововилив у сітівку ока, глаукому, кровотечі в анамнезі, виразкові хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (у стадії загострення), гастроезофагеальний рефлюкс, епілепсія. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.** Підвищена чутливість до компонентів препарату, а також до інших похідних ксантину, гостра серцева недостатність, стенокардія, гострий інфаркт міокарда, некомпенсирована хронічна серцева недостатність, пароксизмальна тахікардія, екстрасистолія, порушення AV-провідності, тяжка артеріальна гіпер- та гіпотензія, розвився щоденний атеросклероз судин, набряк легенів, геморагічний інсульт, крововилив у сітівку ока, глаукома, кровотечі в анамнезі, виразкові хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (у стадії загострення), гастроезофагеальний рефлюкс, епілепсія. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.** Під час лікування не слід вживати алкогольні напої, велику кількість іжі та напоїв, що містять метилкантин (кава, чай, какао, шоколад, кока-кола), споріднені з теофіліном препарати (кофеїн, теобромін, пентоксифілін), оксиліци ці речовини можуть посилювати стимулюючу дію теофіліну на центральну нервову систему. Для теофіліну може посилютися при одночасному застосуванні алопуринолу, ацикловіру, карбімазолу, зафілукасту, циметидину, нізатидину, дисульфіраму, фенілбутазону, феноксаміну, філоконазолу, фторхіонолонів, фурсеміду, ізопреналіну, інтерферону альфа-, ізоназиду, антигастрінів кальцію (верапаміл, ділтазем), лінкоміцину, макролідів, аміодарону, мікселітину, метотрексату, парacetамолу, пентоксифіліну, пероральних контрацептивів, пробенециду, пропafenону, пропранололу, рантініду, таракіну, тіабендазолу, тілоклідину, вілоксазину або вакцини проти грипу. **Особливості застосування.** Перед введенням розчин необхідно нагріти до температури тіла. З обережністю застосовувати при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки при вірусній інфекції, при тривалі гіпертермії, гіпертофії передміхурової залози, тяжкий гіпоксіз, цукровому діабеті, глаукомі, особам похилого віку (від 60 до 70 років). **Застосування в період вагітності або грудного вигодовування.** Препарат протипоказаний при вагітності. За необхідності застосування препарату слід припинити грудне вигодовування. **ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ ІНСТРУКЦІЇ**

\*ХОЗЛ - хронічне обструктивне захворювання легень

Даний матеріал призначений тільки для медичних фахівців та для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів і для друку в спеціалізованих медичних журналах (виданнях). ТОВ «ЮРІЯ·ФАРМ» не рекомендує застосовувати ДЕРКАСТ® з цілями, що відрізняються від прописаних в інструкції. Перед призначенням ДЕРКАСТ®, будь ласка, ознайомтеся з повним текстом інструкції виробника із застосування препарату. РС №UA/15632/01/01

