



# ЛАКСЕРС

Захищений цефалоспорин III покоління —  
впевненість в антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії!

- широкий спектр антибактеріальної активності щодо гр+ та гр- збудників
- захищений сульбактамом від руйнування β-лактамазами
- синергічна дія сульбактаму та цефоперазону, найбільш виражено щодо *Haemophilus influenzae* — поширеного збудника пневмонії\*



\*Склад: дюючі речовини: сеферазон, сульбактам. 1 флакон містить цефоперазон натрію еквівалентно цефоперазону 1000 мг, сульбактам натрію еквівалентно сульбактаму 1000 мг (mg).  
**Показання.** Лікарський засіб Лаксерс застосовують для лікування інфекцій, спричинених чутливими штамами мікроорганізмів: інфекції дихальних шляхів (верхніх і нижніх відділів); інфекції сечовивідних шляхів (верхніх і нижніх відділів); перитоніт, холецистит, холангіт та інші інфекції черевної порожнини; септицемія; менінгіт; інфекції шкіри і м'яких тканин; інфекції кісток і суглобів; запальні захворювання органів малого таза, ендометрит, гонорея та інші інфекції статевих органів.  
**Протипоказання.** Протипоказаний пацієнтам з гіперчувствливістю до дюючих речовин (сульбактаму, цефоперазону), бета-лактамних антибіотиків або до будь-яких допоміжних речовин.  
**Способ застосування та дози.** Лаксерс (комбінація сульбактаму натрію/цефоперазону натрію) випускається у флаконах і застосовується лише парентерально. Звичайна доза лікарського засобу для дорослих становить 2–4 г на добу (тобто від 1 до 2 г цефоперазону на добу) внутрішньом'язово в рівномірно розподілених дозах кожні 12 годин. **Побічні реакції.** Лікарський засіб загалом добре переноситься. Більшість побічних реакцій є легкого або помірного ступеня тяжкості та мають сприятливий перебіг при тривалому лікуванні.

Інформація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для використання у професійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах та симпозіумах з медичної тематики.

Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація — в інструкції для медичного застосування Лаксерсу. РП UA/18254/01/01 Наказ МОЗ №1896 від 17.08.2020