

Щоб бронхообструкція не заважала дихати на повну



УСУНЕННЯ БРОНХОСПАЗМУ З 4-5 ХВИЛИНИ ІНГАЛЯЦІЇ

- ✓ Для швидкого усунення бронхоспазму^{1,2}
- ✓ Покращує легеневу функцію у пацієнтів з БА²
- ✓ Добре переноситься²
- ✓ Відсутні консерванти в допоміжних речовинах¹

ПОТУЖНА ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ НЕБУЛІЗОВАНОГО ГОРМОНУ

- ✓ Проявляє потужну протизапальну дію³
- ✓ Висока клінічна ефективність та безпека⁴
- ✓ Відсутній консервант динатрію едетат у допоміжних речовинах³



НЕБУФЛЮЗОН® Склад. Діюча речовина: флутиказону пропіонат; 1 мл суспензії містить флутиказону пропіонату 1 мг. Показання. Дорослі та діти старші 16 років: профілактичне застосування при важкому ступені астми (хворі, які потребують високих доз інгаляційних або пероральних кортикостероїдів), лікування загострень астми. Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату в анамнезі. Побічні реакції: кандидоз ротової порожнини; дуже рідка ангіоневротичний набряк (головним чином обличчя і ротоглотки), респіраторні симптоми (задишка і/або бронхоспазм) та анафілактичні реакції; дуже рідка симптом Кушинга, кушінгальні ознаки, пригнічення функції наднирників, затримка росту в дітей та підлітків, зниження мінералізації кісток, катаракта і глаукома; дуже рідка гіперглікемія. РС Небуфлюзон® № UA/12542/01/01. **НЕБУТАМОЛ®** Склад. Діюча речовина: сальбутамол; 1 контейнер містить 2,0 мг або 2,5 мг сальбутамолу сульфату в перерахунку на сальбутамол. Показання. Препарат показано для купіювання нападів бронхіальної астми, а також для лікування хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень. Протипоказання. Гіперчутливість в анамнезі до компонентів препарату. Не застосовується при загрозі викидня. Побічні реакції: дуже рідка – реакції гіперчутливості, включно з ангіоневротичним набряком, кропив'янкою, бронхоспазмом, артеріальною гіпотензією та колапсом; рідка – гіпокаліємія; часто – тремор, головний біль, дуже рідка – гіперактивність, дуже рідка – порушення серцевого ритму, включно з фібриляцією шлуночків, суправентрикулярною тахікардією та екстрасистолією, периферійною вазодилатацією, ішемія міокарда, дуже рідка – парадоксальний бронхоспазм. Передозування: мінущі зміни, фармакологічно індуковані бета-агоністами (наприклад, тахікардія, тремор, головний біль), гіпокаліємія. Лікування: припинення прийому сальбутамолу і початок відповідної симптоматичної терапії (призначення кардіоселективних бета-блокаторів для лікування пацієнтів із серцевою симптоматикою). РС Небутамол® № UA/12488/01/01. 1. Лікування загострень бронхіальної астми у дітей: ефективність сальбутамолу для інгаляційного застосування Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ Здоров'я України 2. Адаптовано з інструкції до медичного препарату Небутамол. <http://www.driz.com.ua/>. 3. Адаптовано з інструкції до медичного препарату Небуфлюзон <http://www.driz.com.ua/>. 4. Досвід застосування препарату Небуфлюзон® у лікуванні обструктивного синдрому в дітей Л.Я. Барська, Т.В. Фролова, Кафедра пропедевтики педіатрії №1 Харківського національного медичного університету, Харківська МКЛ № 17

*бронхообструкція/синдром wheezing при бронхіальній астмі у дітей

