

ВДИХАТИ. ВИДИХАТИ. ЛЕГКО ДИХАТИ.

Із застосуванням ІЗІХЕЙЛЕР відзначають покращення контролю БА і ХОЗЛ — у складі терапії першої лінії та після переходу з іншого лікування¹



БА

ХОЗЛ

Більше інформації про Ізіхейлер див. на wehale.life/ua

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ*:

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) Склад: діючі речовини: 1 доза містить будесоніду 160 мкг і формотеролу fumarату дигідрату 4,5 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляції. **Показання.** Буфомікс Ізіхейлер показаний для регулярного лікування бронхіальної астми, коли застосування комбінації (інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β₂-адренорецепторів тривалої дії) є доцільним: для пацієнтів, у яких не досягається адекватний контроль за допомогою інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β₂-адренорецепторів короткотривалої дії, які застосовують «за потреби», або для пацієнтів, у яких досягнутий адекватний контроль при застосуванні як інгаляційних кортикостероїдів, так і агоністів β₂-адренорецепторів тривалої дії. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику кількість молочного білка). **Рекомендовані дози.** Дорослі від 18 років: 1-2 інгаляції двічі на добу. Деяким пацієнтам може потребуватися до 4 інгаляцій двічі на добу (максимальна доза). **Діти віком 12-17 років:** 1-2 інгаляції двічі на добу. **Діти віком до 12 років:** Буфомікс Ізіхейлер не рекомендується дітям до 12 років. **Р. П. № UA/14855/01/01.**

БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР (BUDESONIDE EASYHALER) Склад: діюча речовина: будесонід; 1 доза містить будесоніду 200 мкг. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляції. **Показання.** Персистуюча астма легкого, помірного і важкого перебігу. Будесонід Ізіхейлер не підходить для лікування гострих нападів астми. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду чи лактози (яка містить невелику кількість молочних білків). **Спосіб застосування та дози.** Дозування препарату Будесонід Ізіхейлер слід підбирати індивідуально. Доза завжди має бути знижена до мінімальної, необхідної для забезпечення ефективного контролю перебігу бронхіальної астми. **Дозування двічі на добу.** Дорослі (у тому числі літні пацієнти) і підлітки віком від 12 років: на початку терапії, при важкому перебігу астми, при зниженні дози або при скасуванні пероральних глюкокортикостероїдів доза становить 200-1600 мкг на добу, розподілена на 2 інгаляції. **Легкий або помірний перебіг астми:** доза становить 200-800 мкг на добу, розподілена на 2 інгаляції. У періоди важкого перебігу астми добову дозу можна збільшити до 800 мкг. **Дозування один раз на добу.** Дорослі (у тому числі літні пацієнти) і підлітки віком від 12 років: доза становить 200-800 мкг на добу при бронхіальній астмі легкого і помірного перебігу у пацієнтів, які раніше не отримували інгаляційні глюкокортикостероїди. Пацієнтам, у яких перебіг захворювання вже контролювався інгаляційними стероїдами, дозу можна збільшити до 800 мкг на добу. **Діти віком 5-12 років:** доза становить 200-400 мкг на добу при бронхіальній астмі легкого і помірного перебігу у пацієнтів, які раніше не отримували інгаляційні глюкокортикостероїди або у яких перебіг захворювання вже контролювався інгаляційними стероїдами, що призначаються двічі на добу. **Р. П. № UA/14856/01/01.**

ФОРМОТЕРОЛ ІЗІХЕЙЛЕР (FORMOTEROL EASYHALER) Склад: діюча речовина: формотерол; доза, що виходить із мундштука, містить 12 мкг формотеролу fumarату дигідрату. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляції. **Показання.** Лікування бронхіальної астми у пацієнтів, які використовують інгаляційні кортикостероїди або які потребують лікування β₂-агоністами тривалої дії. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до формотеролу fumarату чи лактози моногідрату (містить невелику кількість молочних білків). Підвищена чутливість до інших β₂-адренергічних стимуляторів. Тахіаритмія, атріовентрикулярна блокада третього ступеня, ідіопатичний підклапанний аортальний стеноз, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, тиреотоксикоз. Пацієнти з підозрюваним чи відомим подовженням інтервалу QT (QTc >0,44 сек). **Спосіб застосування та дози.** Спосіб застосування — інгаляційно. **Дорослі (у тому числі літні пацієнти) та діти віком від 12 років.** Бронхіальна астма. Регулярна підтримуюча терапія: 1 інгаляція (12 мкг) 2 рази на добу. У випадку важких захворювань цей режим дозування можна збільшити до 2 інгаляцій (24 мкг) 2 рази на добу. Максимальна добова доза складає 4 інгаляції (48 мкг) на добу. **Хронічне обструктивне захворювання легень.** Регулярна підтримуюча терапія: 1 інгаляція (12 мкг) 2 рази на добу. Максимальна добова доза складає 2 інгаляції (1 інгаляція 2 рази на добу). **Діти віком 6-12 років.** Бронхіальна астма. Регулярна підтримуюча терапія: 1 інгаляція (12 мкг) 2 рази на добу. Максимальна добова доза складає 24 мкг. **Р. П. № UA/14856/01/01.**



Інформаційний матеріал для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Не є рекламою.
1. Tamási L, Szilasi M, Gálffy G. Clinical effectiveness of budesonide/formoterol Easyhaler® for patients with poorly controlled obstructive airway disease: a real-world study of patient-reported outcomes. Adv Ther 2018;35(8):1140-52.
* Детальну інформацію можна отримати у представника «Юрія-Фарм» та в інструкції для медичного застосування.

«Оріон Корпорейшн»:
Оріонтіне 1
02200, Еспоо, Фінляндія
Тел.: +358 10 426 1
Факс: +358 10 426 38 15
www.orionpharma.com

Представництво в Києві:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Бізнес-центр, офіс 309
Тел.: +38 044 230 47 21
Факс: +38 044 230 47 22
E-mail: office@orionpharma.com.ua
www.orionpharma.com.ua

ТОВ «Оріон Фарма Юкрейн»
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Бізнес-центр, офіс 343
Тел.: +38 044 230 48 44

