



# ІПРІКСОН НЕБ

Іпратропію бромід, сальбутамол

## Єдиний в Україні комбінований бронхолітик в небулах, готовий до лікування бронхоспазму<sup>1,2</sup>

- Комбінація сальбутамолу та іпратропію броміду<sup>2</sup>
- Розслабляє всі гладкі м'язи від трахеї до кінцевих бронхіол і захищає від дії бронхозвужувальних агентів<sup>2</sup>
- Небули з одноразовою дозою не містять консервантів<sup>2</sup>



### Коротка інструкція для медичного застосування препарату Іпріксон Неб

**Склад:** іпратропію бромід, сальбутамол; 1 ампула 2,5 мл містить 0,5 мг іпратропію броміду (у вигляді іпратропію броміду моногідрату) та 2,5 мг сальбутамолу (у вигляді сальбутамолу сульфату); допоміжні речовини: натрію хлорид, розчин кислоти хлористоводневої 1N, вода для ін'єкції.

**Показання:** лікування бронхоспазму у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), які потребують терапії на основі іпратропію броміду і сальбутамолу.

**Протипоказання:** гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія або тахіаритмія. Підвищена чутливість до іпратропію броміду, сальбутамолу, атропіну і його похідних. Дитячий вік до 12 років.

**Побічні реакції:** з боку імунної системи: рідко - анафілактична реакція, ангіоневротичний набряк язика, губ та обличчя. Порушення метаболізму і живлення: рідко - гіпокаліємія. Психічні порушення: рідко - розлади пам'яті; нечасто - неспокій. З боку нервової системи: нечасто - головний біль, запаморочення, тремор. З боку органів зору: рідко - розлади акомодації, біль у очах, мідріаз, підвищений внутрішньочоочний тиск, закритокутова глаукома, набряк рогівки, глаукома, погріщення зору, кон'юнктивальна гіперемія, поява кольорового ореолу навколо джерел світла. З боку серця: нечасто - пальпітації, тахікардія; рідко - аритмія, фібріляція передсердь, ішемічна хвороба серця, надшлуночкова аритмія. Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: часто - кашель, дисфонія, подразнення слизової оболонки горла; рідко - бронхоспазм, парадоксальний бронхоспазм, сухість у горлі, ларингоспазм, орофарингеальний набряк. З боку травного тракту: нечасто - сухість у роті, нудота;

рідко - порушення моторики травного тракту (наприклад, діарея, закреп, блювання), набряк рота, запалення слизової оболонки рота. З боку шкіри та підшкірної клітковини: нечасто - шкірні реакції; рідко - гіпергідроз, висипання, крапив'янка, свербіж. З боку скелетно-м'язової системи, сполучної тканини і кісток: рідко - судоми м'язів, слабкість м'язів, міалгія. З боку нирок і сечовивідних шляхів: нечасто - затримка сечі. Загальні порушення і стани у місці введення: рідко - астенія. Діагностичні доділження: нечасто - підвищений систолічний тиск; рідко - знижений діастолічний тиск (див. повну інструкцію).

**Категорія відпуску:** за рецептром. РП № UA/17999/01/01 від 25.03.2020. Для отримання повної інформації обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування препарату Іпріксон Неб в Україні.

**Матеріал призначено для професійної діяльності фахівців сфері охорони здоров'я. Підлягає розповсюдженню на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.**

1. Станом на грудень 2020 року за даними PharmXplorer, препарат Іпріксон Неб є єдиним препаратом групи R03AL «Адренергічні засоби у комбінації з антихолінергічними засобами», що продається у небулах.

2. Інструкція для медичного застосування препарату Іпріксон Неб.

P-IPR-02-012021

Представництво «Адамед Фарма С. А.» в Україні: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 23, оф 2. Тел.: +38 044 374 67 55

