



БУДІКСОН НЕБ

Суспензія будесоніду¹

Мікронізована суспензія будесоніду із сильною протизапальною дією для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів^{1,2}

- Чинить протизапальну дію, що призводить до зменшення звуження бронхів при алергічних реакціях¹
- Знижує реактивність дихальних шляхів на гістамін та метахолін¹
- Покращує показники оцінки крупу через 6 годин і скорочує тривалість госпіталізації на 33%¹



Коротка інструкція для медичного застосування препарату Будіксон Неб

Склад: будесонід; 1 мл суспензії для розпилення містить 0,125 мг, 0,25 мг або 0,5 мг будесоніду; допоміжні речовини: динатрію едетат, натрію хлорид, твін-80, кислота лимонна безводна, натрію цитрат, вода для ін'єкцій.

Показання: препарат містить потужний негалогенізований кортикостероїд – будесонід, призначений для лікування бронхіальної астми (БА) у пацієнтів, для яких застосування інгаляторів із розпиленням лікарських засобів стиснутим повітрям або у вигляді лікарської форми сухого порошку є неефективним або недоцільним. Будіксон Неб рекомендується для застосування немовлятам і дітям, хворим на круп (ускладнення гострої вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів, також відоме як ларинготрахеобронхіт або підз'язковий ларингіт), яке є показанням для госпіталізації. Препарат призначений для лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), у разі якщо визнано обґрунтованим застосування будесоніду у вигляді суспензії для розпилення. Препарат не показаний для полегшення гострих нападів БА або астматичних станів і апное.

Протипоказання: підвищена чутливість до будесоніду або до будь-якого іншого компонента препарату.

Побічні реакції: інфекції та інвазії: часто – кандидоз ротоглотки, пневмонія (у пацієнтів із ХОЗЛ). З боку імунної системи: рідко – реакції підвищеної чутливості негайного та відстроченого типу, в тому числі висипання, контактний дерматит, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція. З боку ендокринної системи: рідко – ознаки і симптоми системних ефектів глюкокортикостероїдів, у тому числі пригнічення функції надниркових залоз і затримка росту. З боку органів зору: не-

часто – глаукома, затуманений зір; частота невідома – катаракта. З боку скелетно-м'язової системи і сполучної тканини: нечасто – спазми м'язів, тремор м'язів. Психічні порушення: нечасто – занепокоєння, депресія; рідко – дратівливість, зміни у поведінці (переважно у дітей); частота невідома – порушення сну, відчуття страху, психомоторна гіперактивність, агресія. Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: часто – кашель, Захриплість, подразнення горла, дисфонія; рідко – бронхоспазм. З боку шкіри та підшкірної клітковини: рідко – синці (див. повну інструкцію). Категорія відпуску: за рецептом. РП UA/17949/01/01, UA/17949/01/02, UA/17949/01/03 від 25.02.2020.

Для отримання повної інформації обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування препарату Будіксон Неб в Україні.

1. Інструкція для медичного застосування препарату Будіксон Неб.
2. Tomasz R. Sosnowski., M. Odziemek. Steroidy wziewne podawane z nebulizatorów szlachezkowych – co powinniśmy wiedzieć? TERAPIA. 2019; 3.

Матеріал призначено для професійної діяльності фахівців сфери охорони здоров'я. Підлягає розповсюдженню на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики або для індивідуальної відповіді на запит про лікарський засіб.

P-BUD-09-022023

Представництво «Адамед Фарма С.А.» в Україні: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 23, оф. 2. Тел.: +38 044 374 67 55


ADAMED
Для Родини

