

**ВДИХАТИ.
ВИДИХАТИ.
ЛЕГКО ДИХАТИ.**

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ІЗІХЕЙЛЕР ВІДЗНАЧАЮТЬ
ПОКРАЩЕННЯ КОНТРОЛЮ
БА І ХОЗЛ — У СКЛАДІ
ТЕРАПІЇ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ
ТА ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ
З ІНШОГО ЛІКУВАННЯ¹



**БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР БЕЗОПЛАТНИЙ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
згідно наказу МОЗ України № 1495 від 21.08.2023 р.¹**



БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР
80/4,5 120 доз



БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР
160/4,5 120 доз



БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР
320/9 60 доз



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ*:

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) 160/4,5 мг, 120 доз. **Склад:** діючі речовини: 1 доза містить будесоніду 160 мкг і формотеролу fumarату дигідрату 4,5 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляції. **Показання.** Буфомікс Ізіхейлер показаний для регулярного лікування бронхіальної астми, коли застосування комбінації (інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β_2 -адренорецепторів тривалої дії) є доцільним: для пацієнтів, у яких не досягається адекватний контроль за допомогою інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β_2 -адренорецепторів короткотривалої дії, які застосовують «за потреби», або для пацієнтів, у яких вже досягнутий адекватний контроль при застосуванні як інгаляційних кортикостероїдів, так і агоністів β_2 -адренорецепторів тривалої дії. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику кількість молочного білка). **Рекомендовані дози.** Дорослі від 18 років: 1–2 інгаляції двічі на добу. Деяким пацієнтам може потребуватися до 4 інгаляцій двічі на добу (максимальна доза). Діти віком 12–17 років: 1–2 інгаляції двічі на добу. Діти віком до 12 років: Буфомікс Ізіхейлер не рекомендується дітям до 12 років. П. П. № UA/14855/01/01.

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) 80/4,5 мг, 120 доз. **Склад:** діючі речовини: 1 доза містить будесоніду 80 мкг і формотеролу fumarату дигідрату 4,5 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляції. **Показання.** Лікарський засіб Буфомікс Ізіхейлер (80 мкг/4,5 мкг) показаний для застосування дорослим, підліткам та дітям віком від 6 років. Лікарський засіб показаний для регулярного лікування бронхіальної астми у випадку доцільного застосування комбінованої терапії (інгаляційного кортикостероїду та β_2 -агоніста тривалої дії). **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику кількість молочного білка). **Рекомендовані дози.** Лікарський засіб Буфомікс Ізіхейлер не призначають для початкового лікування бронхіальної астми. Дорослі (віком від 18 років): 1–2 інгаляції 2 рази на добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 4 інгаляцій 2 рази на добу. Підлітки (12–17 років): 1–2 інгаляції 2 рази на добу. Діти (віком від 6 років): 2 інгаляції 2 рази на добу. П. П. № UA/14855/01/02.

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) 320/9 мкг, 60 доз. **Склад:** діючі речовини: 1 доза містить будесоніду 320 мкг і формотеролу fumarату дигідрату 9 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляції. **Показання.** Лікарський засіб Буфомікс Ізіхейлер (320 мкг/9 мкг) показаний дорослим та підліткам (віком від 12 років) для регулярного лікування бронхіальної астми, коли застосування комбінації (інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β_2 -адренорецепторів тривалої дії) є доцільним. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику кількість молочного білка). **Рекомендовані дози.** Бронхіальна астма. Дорослі (віком від 18 років): 1 інгаляція 2 рази на добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 2 інгаляцій 2 рази на добу. Підлітки (12–17 років): 1 інгаляція 2 рази на добу. ХОЗЛ. **Рекомендовані дози:** Дорослі: 1 інгаляція 2 рази на добу. П. П. № UA/14855/01/03.

Посилання:

1. Наказ МЗЗ України № 351 від 21.02.2023 р., який затверджує національні стандарти лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за державною підтримкою ліку.
2. A Multicenter, Observational, Prospective study of the effectiveness of Switching from Budesonide/Formoterol Turbuhaler® to Budesonide/Formoterol Easyhaler® Jürgen J. van Linge, Mikkel Söberg Aardt. *Throm J* 2019;36(3):1775-1769. doi: 10.1007/s12325-019-09409-7.
3. Gálffy G, Mezei G, Németh G, Tinsli I, Müller V, Selroos O, Orsz M. Inhaler compliance and patient satisfaction with Easyhaler®: results of two real-life multicentre studies in asthma and COPD. *Drugs R* 2013;13(3):215–22.
4. Tamsil L, Szilasi M, Gálffy G. Clinical effectiveness of Budesonide/Formoterol Easyhaler® for patients with poorly controlled obstructive pulmonary disease. *Drugs R* 2015;15(3):215–22.

«Оріон Корпорейшн»:
Оріонітіе 1
02200, Еспоо, Фінляндія
Тел.: +358 10 426 1
Факс: +358 10 426 38 15
www.orionpharma.com

Представництво в Києві:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Бізнес-центр, офіс 309
Тел.: +38 044 230 47 21
Факс: +38 044 230 47 22
E-mail: office@dorionpharma.com.ua
www.orionpharma.com.ua

ТОВ «Оріон Фарма Україна»
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Бізнес-центр, офіс 343
Тел.: +38 044 230 48 44

