



ЗАФІРОН

Формотеролу фумарат

Швидкодіючий бронхолітик тривалої дії для базової терапії ХОЗЛ і БА¹

- Профілактика й лікування бронхоспазму²
- Початок дії в межах 1–3 хвилин²
- Ефект зберігається упродовж 12 годин після інгаляції²



Коротка інструкція для медичного застосування препарату Зафірон

Склад: формотеролу фумарат (formoterole); 1 капсула містить формотеролу фумарату дигідрату 12,5 мкг еквівалентно формотеролу фумарату 12 мкг; допоміжні речовини: лактози моногідрат напівмікронізований, лактози моногідрат мікронізований, желатин.

Показання: профілактика й лікування бронхоспазму у хворих на бронхіальну астму; профілактика бронхоспазму, спричиненого алергенами, холодним повітрям або фізичним навантаженням; профілактика й лікування порушень бронхіальної прохідності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ), у т. ч. з хронічним бронхітом і емфіземою.

Протипоказання: підвищена чутливість до формотеролу або до інших компонентів препарату.

Побічні реакції: з боку імунної системи: рідко – реакції гіперчутливості, включаючи артеріальну гіпотензію, бронхоспазм, кропив'янку, ангіоневротичний набряк, свербіж, екзантему. Порушення метаболізму й харчування: рідко – гіпокаліємія; дуже рідко – гіперкаліємія. З боку ЦНС: часто – головний біль, тремор; іноді – збудження, відчуття тривожності, нервозність, безсоння, запаморочення; дуже рідко – зміна смакових відчуттів. З боку серцево-судинної системи: часто – відчуття серцебиття; іноді – тахікардія; рідко – аритмія, наприклад, фібриляція передсердь, надшлуночкова тахікардія, екстрасистола; дуже рідко – стенокардія, подовжений інтервал QT на кардіограмі, периферичні набряки. З боку дихальної системи та грудної клітки:

іноді – парадоксальний бронхоспазм, кашель, висипання, підвищення артеріального тиску (включаючи гіпертензію), алергічні реакції, подразнення глотки. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – нудота. З боку кістково-м'язової системи: іноді – судоми, міалгія (див. повну інструкцію).

Категорія відпуску: за рецептом. РП №UA/3759/01/01 від 17.01.2020. Для отримання повної інформації обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування препарату Зафірон в Україні.

Матеріал призначено для професійної діяльності фахівців сфери охорони здоров'я. Підлягає розповсюдженню на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики або для індивідуальної відповіді на запит про лікарський засіб.

1. Толох О.С. Оптимізація терапії ХОЗЛ з урахуванням клінічного фенотипу/ О.С. Толох, Н.Д. Рудницька, У.Б. Чуловська, Х.І. Вольницька // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2015. – №9–10 (88–89).
2. Інструкція для медичного застосування препарату.

UA-ZAF-001-AM-0225-P