

ЦЕФМА –

ВАША ТОЧКА ОПОРИ У НЕРУТИННИХ
СИТУАЦІЯХ, КОЛИ ПЕРША ЛІНІЯ НЕ МОЖЕ
БУТИ ПРИЗНАЧЕНА*



*мається на увазі коли пацієнт приймав напередодні антибіотики з групи пеніцилінів або у пацієнта є алергія на амоксициліни або захищені амоксициліни.

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЦЕФМА (CEFMA) ТА ЦЕФМА ДИТЯЧА СУСПЕНЗІЯ (CEFMA CHILD SUSPENSION):

Діюча речовина: цефподоксим; 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить цефподоксиму проксетил, що відповідає 200 мг цефподоксиму 5 мл оральної суспензії, містить цефподоксиму проксетил 52,219 мг, що відповідає 40 мг цефподоксиму; допоміжні речовини: для детальної інформації див. повну інструкцію до медичного застосування. **Лікарська форма.** таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Порошок для оральної суспензії. **Фармакотерапевтична група.** Антибактеріальні засоби для системного застосування. Інші β-лактаміні антибіотики. Цефалоспорины III покоління. Код АТХ J01D D13. **Показання Цефма дитяча суспензія.** Лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату збудниками: інфекції ЛОР-органів (включаючи синусити, тонзиліти, фарингіти, гострі та середні отити); інфекції дихальних шляхів (включаючи пневмонію, бронхопневмонію, гостру екзацерацію хронічного бронхіту); неускладнені інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів; інфекції шкіри та м'яких тканин. **Показання Цефма.** Лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату збудниками:

- інфекції ЛОР-органів (включаючи синусит, тонзиліт, фарингіт); для лікування тонзиліту і фарингіту цефподоксим слід призначати у разі хронічної або рецидивної інфекції, а також у випадках відомої або підозрюваної нечутливості збудника до широкозастосовуваних антибіотиків;
- інфекції дихальних шляхів (включаючи гострий бронхіт, рецидиви або загострення хронічного бронхіту, бактеріальну пневмонію);
- неускладнені інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів (включаючи гострий пієлонефрит і цистит);
- інфекції шкіри та м'яких тканин (абсцеси, целюліт, інфіковані рани, фурункули, фолікуліт, пароніхія, карбункули і виразки);
- неускладнений гонококовий уретрит.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 4 тижнів до 12 років. Немовлятам віком від 4 тижнів до 3 місяців з нирковою недостатністю лікування препаратом не рекомендується, оскільки такий досвід відсутній. Таблетки призначають дітям віком від 12 років по 100 мг (1/1 таблетки) 2 рази на добу. **Категорія відпуску.** За рецептом. РП UA/18064/01/01, UA/14864/01/02. Лікарські засоби мають протипоказання та можуть викликати побічні реакції. Для більш детальної інформації дивіться інструкцію для медичного застосування лікарського засобу. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника: +380 44 495 28 66 (вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку), adverse.event.ukraine@sandoz.com, patient.safety.ukraine@sandoz.com, www.sandoz.ua. ТОВ «Сандоз Україна» м. Київ, пр. С. Бандери, 28-А (літера Г). Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров'я. 4-07-ЦЕФ-РЕЦ-0125