

ВДИХАТИ. ВИДИХАТИ. ЛЕГКО ДИХАТИ.

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ІЗІХЕЙЛЕР ВІДЗНАЧАЮТЬ
ПОКРАЩЕННЯ КОНТРОЛЮ
БА І ХОЗЛ — У СКЛАДІ
ТЕРАПІЇ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ
ТА ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ
З ІНШОГО ЛІКУВАННЯ¹



**БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР БЕЗОПЛАТНИЙ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»**
згідно наказу МОЗ України № 1537 від 04.09.2024 р.¹



БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР
80/4,5 120 доз

БЕЗОПЛАТНО



БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР
160/4,5 120 доз

БЕЗОПЛАТНО



БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР
320/9 60 доз

БЕЗОПЛАТНО

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ*:

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) 160/4,5 мкг, 120 доз. **Склад:** діючі речовини: 1 доза містить будесонід 160 мкг і формотеролу фумарату дигідрату 4,5 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляцій. **Показання.** Буфомікс Ізіхейлер показаний для регулярного лікування бронхіальної астми, коли застосування комбінації (інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β_2 -адренорецепторів тривалої дії) є доцільним; для пацієнтів, у яких не досягається адекватний контроль за допомогою інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β_2 -адренорецепторів короткотривалої дії, які застосовують «за потреби», або для пацієнтів, у яких вже досягнутий адекватний контроль при застосуванні як інгаляційних кортикостероїдів, так і агоністів β_2 -адренорецепторів тривалої дії. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику кількість молочного білка). **Рекомендовані дози.** Дорослі (віком від 18 років): 1–2 інгаляції двічі на добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 4 інгаляцій двічі на добу (максимальна доза). Діти (віком від 6 років): 1–2 інгаляції двічі на добу. Підлітки (12–17 років): 1–2 інгаляції 2 рази на добу. Діти (віком від 6 років): 1–2 інгаляції 2 рази на добу. Р. П. № UA/14855/01/01.

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) 80/4,5 мкг, 120 доз. **Склад:** діючі речовини: 1 доза містить будесонід 80 мкг і формотеролу фумарату дигідрату 4,5 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляцій. **Показання.** Лікарський засіб Буфомікс Ізіхейлер (80 мкг/4,5 мкг) показаний для застосування комбінованої терапії (інгаляційного кортикостероїду та β_2 -агоніста тривалої дії). **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику кількість молочного білка). **Рекомендовані дози.** Лікарський засіб Буфомікс Ізіхейлер не призначають для початкового лікування бронхіальної астми. Дорослі (віком від 18 років): 1–2 інгаляції 2 рази на добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 4 інгаляцій 2 рази на добу. Підлітки (12–17 років): 1–2 інгаляції 2 рази на добу. Діти (віком від 6 років): 1–2 інгаляції 2 рази на добу. Р. П. № UA/14855/01/02.

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) 320/9 мкг, 60 доз. **Склад:** діючі речовини: 1 доза містить будесонід 320 мкг і формотеролу фумарату дигідрату 9 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. **Лікарська форма.** Порошок для інгаляцій. **Показання.** Лікарський засіб Буфомікс Ізіхейлер (320 мкг/9 мкг) показаний дорослим та підліткам (віком від 12 років) для регулярного лікування бронхіальної астми, коли застосування комбінації (інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β_2 -адренорецепторів тривалої дії) є доцільним. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику кількість молочного білка). **Рекомендовані дози.** Дорослі (віком від 18 років): 1 інгаляція 2 рази на добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 2 інгаляцій 2 рази на добу. Підлітки (12–17 років): 1 інгаляція 2 рази на добу. ХОЗЛ. **Рекомендовані дози:** Дорослі: 1 інгаляція 2 рази на добу. Р. П. № UA/14855/01/03.

Посилання:
1. Наказ МОЗ України № 1537 від 04.09.2024 р., який затверджує оновлений реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки»
2. A Multicenter, Observational, Prospective Study of the Effectiveness of Switching from Budesonide/Formoterol Turbuhaler® to Bufomix Izixeler®. Jorgensen S, Ines Vinje, Mikael Sörberg Adv Ther. 2019 Jul;36(7):1756-1769. doi: 10.1007/s12325-019-00940-7.
3. Gálffy G, Mezei G, Németh G, Tamási L, Müller V, Selroos O, Oraszi M. Inhaler competence and patient satisfaction with Easyhaler®: results of two real-life multicentre studies in asthma and COPD. Drugs R D 2013;13(3):215-22.
4. Tamási L, Selroos O, Gálffy G. Clinical effectiveness of budesonide/formoterol Easyhaler® for patients with poorly controlled obstructive pulmonary disease: a real-world study of patient-reported outcomes. Adv Ther 2018;35(8):1140-52.

«Оріон Корпорейшн»:
Оріонтіе 1
02200, Еспоо, Фінляндія
Тел.: +358 10 426 1
Факс: +358 10 426 38 15
www.orionpharma.com

Представництво в Києві:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Бізнес-центр, офіс 309
Тел.: +38 044 230 47 21
Факс: +38 044 230 47 22
E-mail: office@orionpharma.com.ua
www.orionpharma.com.ua

ТОВ «Оріон Фарма Юкрейні»
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Бізнес-центр, офіс 343
Тел.: +38 044 230 48 44

ORION

