

УДК 616.24.-002.5.036-085.001.5
МПК – 7: А61 К 31/00, А61 К 31/43, А61 Р 31/06
№ держреєстрації 0107U001208
Інв. №

Академія медичних наук України
Національний інститут фізичної реабілітації і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (НІФП)
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. (044) 275 54 88; факс (044) 275 21 18
E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Державної установи “Національний інститут фізичної реабілітації і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України” академік АМН України, д-р. мед. наук, професор

Ю. І. Феценко

2009.12.08

З В І Т

ПРО НАУКОВО – ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ СТАНДАРТНІ РЕЖИМИ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОВТОРНОГО КУРСУ ЛІКУВАННЯ ТА МАЮТЬ ВИСОКИЙ РИЗИК НАЯВНОСТІ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ЗБУДНИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

А.07.02.

(заключний)

Заст. директора з науково-методичної та науково-організаційної роботи
д-р мед. наук, професор

В. М. Мельник

2009.11.26

Керівники НДР:
зав. відділом фізичної реабілітації,
д-р мед. наук, професор

В. М. Петренко

2009.11.26

Провідний наук. співроб.
д-р мед. наук, професор

С. О. Черенько

2009.11.26

Рукопис закінчено 24 листопада 2009 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: с. 175, 23 табл., 50 джерел, 4 додатки.

Об'єкт дослідження: 507 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які потребують призначення повторного лікування.

Мета роботи: підвищити ефективність хіміотерапії (ХТ) хворих на туберкульоз легень, що раніше лікувались та в яких невідома чутливість збудника до протитуберкульозних препаратів шляхом розробки стандартного режиму за 4 категорією.

Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні, клініко-лабораторні, мікробіологічні.

Розроблені стандартні режими хіміотерапії для 4 клінічної категорії для лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання (РТБ), які потребують призначення повторного лікування з високим ризиком мультирезистентного туберкульозу (РМРТБ), та встановлена їх ефективність та переносимість, що дозволяє досягти припинення бактеріовиділення у 53,3 % хворих і підвищити результати лікування на 25,8 %.

Ступінь впровадження – опубліковано 78 наукові роботи, підготовлено 11 проектів наказів МОЗ України, 1 методрекомедацій, 2 інформаційних листів, 3 заявка на винахід, отримано 2 патентів на винахід, зроблено 55 доповідей, проведено 14 семінарів для лікарів і журналістів України.

Галузь застосування – фтизіатрія.

ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, РЕЦИДИВИ, РИЗИК, МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ХІМІОТЕРАПІЯ.

Умови одержання звіту: за угодою 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, ДУ "НІФП".