

УДК: 616.25-002.155-079.4-036.8.001.5

№ держреєстрації 0110U001215

Інв. № 0212U008836

Національна академія медичних наук України
Державна установа “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України”
(НІФП НАМН)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, тел.: 275 04 02, факс: 275 21 18

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП НАМН,
академік НАМН України,
д-р мед. наук, професор

_____ Ю. І. Фещенко

2012.12.11

З В І Т

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПЛЕВРАЛЬНИХ
ВИПОТІВ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ ТА РОЗРОБИТИ НОВУ ТЕХНОЛОГІЮ ЇХ ЛІКУВАННЯ

А.10.10

(заключний)

Заст. директора з науково-методичної
та науково-організаційної роботи,
д-р мед. наук, професор

2012.12.06

В. М. Мельник

Керівник НДР, завідуючий відділенням
торакальної хірургії та інвазивних
методів діагностики, д-р мед. наук

2012.11.30

М. С. Опанасенко

2012

Рукопис закінчено 30 листопада 2012 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 306 с., 70 таблиць, 4 додатки, 105 джерел.

Об'єкт дослідження – 394 хворих з плевральним випотом різної етіології пролікованих із застосуванням консервативної терапії і різних інвазивних методик.

Мета роботи – оптимізація лікувальних методів при плевральних випотах різного генезу шляхом створення єдиної лікувальної технології на основі оцінки ефективності інвазивних і консервативних лікувальних методів при різних етіологічних і клінічних формах даної патології.

Методи дослідження – комплексне клініко-інструментальне і клініко-лабораторне обстеження, цитологічні, мікробіологічні, патоморфологічні, статистичні методи.

Вивчена ефективність консервативної терапії та різних інвазивних методів лікування плевральних випотів. Вивчена ефективність застосування різних методик плевректомії з декортикацією легені. Розроблено 9 нових способів, які, залежно від застосованого способу, дозволили підвищити ефективність лікування хворих з плевральними випотами: «Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу» – на 23,3 %, «Спосіб лікування плеврального випоту неясного генезу, ускладненого випітним перикардитом» – на 18,3 %, «Спосіб лікування плеврального випоту різного генезу» – на 21,5 %, «Спосіб лікування ексудативного плевриту різного генезу» – на 10,7 %, «Спосіб знеболення після операцій на легенях і плеврі» – на 21,5 %, «Спосіб корекції плевральної порожнини при резекції легені» – на 21,7 %, «Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях і плеврі, що супроводжується різними видами торакопластики» – на 26,0 %, «Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операцій на легенях і плеврі» – 14,7 %, «Спосіб лікування плеврального випоту туберкульозного генезу» – на 11,3 %. Розроблено алгоритм послідовності застосування різних інвазивних методів лікування плевральних випотів.

Ступінь впровадження: підготовлено 0 проектів нормативних документів, отримано 8 патентів, опубліковано 0 монографій та посібників, 99 наукових робіт, 0 методичних рекомендацій, 2 посібника для лікарів, 8 інформаційних листів, підготовлено 8 нововведень, зроблено 33 наукових доповіді, проведено 0 курсів інформації та стажування, отримано 34 акта впровадження.

Галузь застосування – фтизіатрія, пульмонологія, торакальна хірургія.

ВИПІТНИЙ ПЛЕВРИТ, ПЛЕВРАЛЬНИЙ ВИПІТ, ВІДЕОТОРАКОСКОПІЯ, ПЛЕВРЕКТОМІЯ, ДЕКОРТИКАЦІЯ ЛЕГЕНІ.

Умови одержання звіту: за угодою. 03680, м. Київ, вул. Амосова, 10, НІФП НАМН.